

Užití nákusné relaxační dlahy při terapii onemocnění temporomandibulárního kloubu

Machoň V.

Dětská stomatologická klinika, FN Motol, Praha,
přednosta doc. MUDr. J. Kozák, CSc.

Souhrn

Autor se zabývá hodnocením úspěšnosti terapie dysfunkcí temporomandibulárního kloubu při užití nákusné relaxační dlahy. V uvedené studii byla dlaha zhotovena z termoplastické folie vakuovou technikou, ve všech případech na dolní zubní oblouk. Délka trvání terapie byla 3 měsíce.

Při hodnocení 6 měsíců od zahájení terapie nákusnou dlahou byla tato léčebná metoda nejvíce úspěšná u extrakapsulárních onemocnění (100 %), naopak nejmenší efekt byl u intrakapsulárních onemocnění (dislokace disku s repozicí – 31 %, dislokace disku bez repozice – 55 %) – zde má dlaha výrazný efekt na snížení bolesti, nicméně minimální na repozici dislokovaného disku. U zánětlivě-degenerativních onemocnění (arthritis, osteoarthritis) byla úspěšnost 65 %.

Klíčová slova: onemocnění temporomandibulárního kloubu – nákusná relaxační dlaha

Machoň V.:

The Use of Occlusion Relaxation Splint during Therapy of Temporomandibular Joint Diseases

Summary: The author deals with the evaluation of successfullness in the therapy of dysfunction of temporomandibular joint with the application of occlusion relaxation splint. The described study applied a splint made from a thermoplastic foil by a vacuum technique, treating the lowed dental arch in all cases. The therapy lasted three months.

In the evaluation of six months from the beginning of the treatment with the occlusion splint, the therapy was most successful in extracapsular diseases (100%), whereas the works effect was observed in intracapsular diseases (dislocation of the disc with reposition – 31%, disc dislocation without reposition – 55%). It these cases the splint proved to have a marked effect in decreasing pain, whereas a minimum effect was observed on the reposition of the dislocated disc. In the inflammatory-degenerative diseases (arthritis, osteoarthritis) the successfullness proved to be 65%.

Key words: diseases of tempromandibular joint – occlusion relaxation splint

Čes. Stomat., roč. 106, 2006, č. 3, s. 93–97.

ÚVOD

Terapie onemocnění čelistního kloubu je vždy na prvním místě konzervativní. Spočívá v šetřícím klidovém režimu, analgoterapii, izometrických cvičení, masážích žvýkacích svalů, termoterapii a v neposlední řadě v užití okluzních dlah.

Okluzní dlaha (occlusal splint) je odstranitelný okluzní povrch z plastického materiálu (nejčastěji pryskyřice), o síle v průměru 1,5–2,5 mm. Dlaha musí zabezpečovat souměrný oboustranný artikulační kontakt zubních oblouků, musí být dostatečně pevná, s hladkými okraji, s dobrou retencí. Dlaha pokrývá pouze zuby, nesmí dráždit periodoncium, nesmí být funkční překážkou, omezovat pohyb jazyka, fonaci a polykání. Může být zhotovena na horní nebo dolní zubní oblouk,

přičemž se upřednostňuje dolní zubní oblouk – dlaha je více skryta a nenarušuje tak estetický vzhled pacienta (eventuálně se doporučuje užívání dlah, které nepřekrývají incizální oblast). Okluzní dlaha se užívá v první fázi onemocnění temporomandibulárního kloubu v průběhu dne i noci, a to v průměru po dobu 3, maximálně 6 měsíců. Neslouží však k trvalému užívání, které můžezpůsobit ireverzibilní změny v mastikačním systému, poškození periodoncia, může vést ke změnám morfologie čelistního kloubu.

V současné době se užívá celá řada druhů okluzních dlah, přičemž nejčastější je:

- Nákusná relaxační dlaha, vytvořená z teplem formovatelné folie. Její funkce spočívá v eliminaci předčasných kontaktů zubních oblouků a ve zvýšení skusu – tím dochází k vyvážení

okluze a artikulace, ke snížení intraartikulárního tlaku v kloubech, eliminaci neuromusku-lárního spasmus žvýkacích svalů.

- Anterorepoziční dlaha - protruzní repoziční dlaha. Jejím cílem je zejména vytvoření normálního vztahu kondyl – disk. Vysouvá čelist ventrálně o 1–3 mm, čímž se dislokovaný disk může reponovat zpět na kloubní hlavici. Poté je protruzní postavení na dlaze postupně obrúšováno, mandibula se pomalu vrací do normální polohy. Anterorepoziční dlahu je ovšem nutné indikovat obezřetně, vzhledem k možným vedlejším účinkům (změny okluze ve smyslu laterálního otevřeného skusu) [1, 2, 3, 4].

MATERIÁL A METODY

Celkem bylo hodnoceno 101 pacientů, kteří podstoupili léčbu dysfunkce čelistního kloubu pomocí nákusné relaxační dlahy. Pacienty jsme podle RCA/TMD (Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders) rozdělili do skupin (G-groupe):

G I- extrakapsulární onemocnění (9 pacientů),

G II- intrakapsulární poruchy (57 pacientů: 19 s diagnózou dislokace disku s repozicí, 38 s diagnózou dislokace disku bez repozice),

G III- zánětlivě degenerativní onemocnění (35 pacientů: 20 s diagnózou arthritis, 15 s diagnózou osteoarthritis).

GI:

Extrakapsulární onemocnění

(9 pacientů, 1 muž – 8 žen, průměrný věk: 30,1)


1 měsíc po nasazení dlahy: zlepšení: 60 % průměrná doba trvání potíží 10 týdnů

bez zlepšení: 40 % průměrná doba trvání potíží 30 týdnů

2 měsíce po nasazení dlahy: zlepšení: 100 %

3 měsíce po nasazení dlahy: zlepšení: 100 %

Recidiva potíží nebyla zaznamenána (graf 1)



Nákusná relaxační dlaha byla zhotovena na dolní zubní oblouk, a to v laboratoři z termoplastické folie o síle 1,5 mm vakuovou technikou na sádrovém modelu.

Pacienti užívali dlahu 1 měsíc – po většinu času, minimálně však v noci. Jakmile nastalo zlepšení v průběhu užívání nákusné dlahy - užívala se ještě po dobu 3 týdnů a poté se v době dalších 3 týdnů - začala postupně vynechávat, s tím, že poté bylo užívání dlahy zcela vynecháno.

Hodnocení pacientů probíhalo 1 měsíc, 2 měsíce, 3 měsíce po nasazení dlahy a nakonec 6 měsíců od začátku terapie, kdy se kontrolovalo rozmezí otevřívání a bolesti.

Bolest patient klasifikoval stupnicí 0–5 (0 – bez bolesti, 1 – mírná, 2 – výraznější, 3 – střední, 4 – výrazná, 5 – nesnesitelná). Rozmezí otevřívání bylo hodnoceno lékařem (měřena byla vzdálenost rezákových bodů horní a dolní čelisti).

Pro označení „zlepšení“ byl stav s bolestí 0–1, s otevříváním nad 35 mm.

VÝSLEDKY

G I (extrakapsulkární onemocnění)- zlepšení celkem: 100 %

G II (intrakapsulkární onemocnění)- zlepšení celkem: 43 %

GIII (zánětlivě degenerativní onemocnění)- zlepšení celkem: 65 %

GII:

Dislokace disku s repozicí (provázena bolestí)

(19 pacientů, pouze ženy, průměrný věk: 28)


1 měsíc po nasazení dlahy: zlepšení: 36 % průměrná doba trvání potíží 5 týdnů

bez efektu: 64 % průměrná doba trvání potíží 7 týdnů

2 měsíce po nasazení dlahy: zlepšení: 31 %

bez efektu: 69 % (5% recidiva potíží)

3 měsíce po nasazení dlahy: zlepšení: 31 %
bez zlepšení: 69 %
6 měsíců po nasazení dlahy: zlepšení: 31 %
bez zlepšení: 69 % (graf 2)




Graf 2. Účinnost nákusné relaxační dlahy při terapii dislokace disku s repozicí.

Dislokace disku bez repozice

(38 pacientů, 6 mužů – 32 žen, průměrný věk: 25,2)

1 měsíc po nasazení dlahy: zlepšení: 34 % průměrná doba trvání potíží 6 týdnů
bez zlepšení: 66 % průměrná doba trvání potíží 11 týdnů
2 měsíce po nasazení dlahy: zlepšení: 52 %
bez zlepšení: 48 %
3 měsíce po nasazení dlahy: zlepšení: 60 %
bez zlepšení: 40 % (5% recidiva potíží)
6 měsíců po nasazení dlahy: zlepšení: 55 %
bez zlepšení: 45 % (8% recidiva potíží) (graf 3)




Graf 3. Účinnost nákusné relaxační dlahy při terapii dislokace disku bez repozice.

GIII:

Arthritis

(20 pacientů, 3 muži – 17 žen, průměrný věk: 35,85)

1 měsíc po nasazení dlahy: zlepšení: 50 % průměrná doba trvání potíží 7 týdnů
bez efektu: 50 % průměrná doba trvání potíží 18 týdnů
2 měsíce po nasazení dlahy: zlepšení: 70 %
bez efektu: 30 % (5% recidiva potíží)
3 měsíce po nasazení dlahy: zlepšení: 70 %
bez efektu: 30 %
6 měsíců po nasazení dlahy: zlepšení: 70 %
bez efektu: 30 % (graf 4)



Graf 4. Účinnost nákusné relaxační dlahy při terapii arthritis.

Osteoarthritis

(15 pacientů, 3 muži – 12 žen, průměrný věk: 50,4)

1 měsíc po nasazení dlahy: zlepšení: 26 % průměrná doba trvání potíží 17 týdnů

bez efektu: 74 % průměrná doba trvání potíží 21 týdnů

2 měsíce po nasazení dlahy: zlepšení: 52 %

bez efektu: 48 %


3 měsíce po nasazení dlahy: zlepšení: 60 %

bez efektu: 40 %

6 měsíců po nasazení dlahy: zlepšení: 60 %

bez efektu: 40 %

Recidiva potíží nebyla zaznamenána (graf 5)



Graf 5. Účinnost nákusné relaxační dlahy při terapii osteoarthritis.

DISKUSE

Okluzní dlaha splní své poslání tehdy, když vymizí bolesti, zvukové fenomény, spasmy žvýkačích svalů. Jak ukázaly výsledky práce, léčebný efekt nákusné (relaxační) dlahy byl prokázán celkově u všech typů onemocnění, celkově byla dlahy úspěšná v 63,2 %, což v podstatě souhlasí s dalšími autory [5, 6].

Největší terapeutický efekt byl dosažen u onemocnění zařazených do skupiny G I (extrakapsulární onemocnění) – terapie byla úspěšná u všech pacientů (100%). Tyto výsledky jen potvrzují, že nákusná relaxační dlahy je plně indikována pro svalová onemocnění. [2, 3, 7, 8] Nákusná dlahy zvyšuje skus, vyrovňává okluzní nesoulad, címž eliminuje neuromuskulární spasmus žvýkačích svalů. [2, 3]

Naopak nejmenší účinnost měla nákusná dlahu u skupiny onemocnění G II (intrakapsulární onemocnění ve smyslu dislokace disku s repozicí, dislokace disku bez repozice). Celkem byla úspěšná u 43 % pacientů. Výraznější efekt byl u dislokace disku bez repozice (55%), zatímco u dislokace disku s repozicí došlo v 95 % ke snížení bolesti, ale zvukový fenomén (související s dislokací disku) vymizel pouze u 31 % pacientů. To potvrzuje skutečnost, že při terapii nákusnou dlahou nedochází k repozici disku. Léčebný efekt spočívá ve snížení intraartikulárního tlaku, ve snížení bolesti. Při anteriorní dislokaci disku je retrodiskální tkáň vystavena kontinuálnímu tlaku. Nákusná dlahu pak způsobí vzdálení pozice kondylu a uvolnění zatížení na vysoce inervovanou a vaskularizovanou retrodiskální tkáň. Během terapie dlahou následně dochází k adaptačním a reparačním změnám, které vedou k fib-

rotizaci a avaskularitě retrodiskální tkáně. Tento proces pochopitelně souvisí se snížením bolesti, což umožní rehabilitaci otevřání. [2, 7, 9, 10, 11, 12] Vzhledem k tomu, že nákusná relaxační dlahy pouze zvyšuje skus, je u pacientů s dislokací disku častěji indikována dlahy anterorepoziční, u které se předpokládá, že umožní repozici disku [7, 11, 13]. Nicméně úspěšnost repozice disku při užití anterorepoziční dlahy je hodnocena 16–40 % [11, 13]. Navíc u anterorepoziční dlahy je nutné vzít v úvahu vyšší riziko nežádoucích účinků [11].

U onemocnění zařazených do skupiny G III (zánětlivě-degenerativní onemocnění) byla úspěšnost celkem 65 %. Tento fakt je dán samotným mechanismem účinku nákusné relaxační dlahy – odlehčuje kloub, snižuje intraartikulární tlak. Se snížením intraartikulárního tlaku pochopitelně souvisí snížení destruktivních změn chrušavky [4, 8, 14].

Úspěšnost léčby nákusnou dlahou souvisí také s včasným zahájením terapie. Stiesch a Scholz [5] zaznamenali u pacientů s nebolestivou dislokací disku bez repozice zlepšení po terapii dlahou u 84 % pacientů s akutními potížemi, 63 % a 64 % u pacientů se subakutními a chronickými potížemi. Ostatně výsledky autora tuto teorii potvrzují, po jednom měsíci terapie nákusnou dlahou nastalo zlepšení u pacientů, u nichž trvání potíží bylo v průměru 9 týdnů. Oproti tomu bez efektu 1 první měsíc terapie nákusnou dlahou u pacientů s potížemi trvajícími v průměru 17,4 týdne.

Rozdíly panují v publikovaných pracích v souvislosti se sílou dlahy. Kotráň [2] doporučuje dlahu zvyšující skus o 4–6 mm v interinciziválním rozmezí, má-li být odlehčení účinné. Nicméně autor se přiklání k názoru, že plně dostatečná

je dlaha o síle 1-2 mm [7, 8], přičemž upřednostňuje užívání na dolní zubní oblouk vzhledem k snadnějšímu zakrytí dolním rtem.

ZÁVĚR

Užití nákusné relaxační dlahy je plnohodnotnou léčebnou metodou onemocnění temporomandibulárního kloubu. Účinek relaxační dlahy je zaměřen především na snížení bolesti.

Pro užití nákusné relaxační dlahy o síle 1,5 mm jsou absolutní indikací extrakapsulární onemocnění, kdy je možné dosáhnout výborných výsledků.

U zánětlivě degenerativních onemocnění a intrakapsulárních onemocnění je úspěšnost terapie relaxační dlahou nižší, nicméně patří do základních postupů konzervativní terapie. Dlaha se u těchto onemocnění užívá jako jedna z prvních terapeutických možností, a teprve v případě neúčinnosti léčby se indikují další léčebné postupy (miniinvazivní terapie, operační řešení).

Při užití dlahy jsou lepší výsledky dosaženy s včasním zahájením terapie.

LITERATURA

1. **Bumann, A., Lotzman, U.:** TMJ disorders and orofacial pain. Tyjeme Stuttgart-New York, 2002, 360 s.
2. **Kotrán, M., Paško, E.:** Náhryzové živcové dlahy v protetickém liečbe artropatií temporomandibulárního kloubu. Stomatolog., 1994; 3, s. 83-85.
3. **Van Put, E.:** Relation between occlusal disorders and TMJ complains, Int. J Oral Maxillofac Surg 2003; Suppl 1, 58
4. **Zajko, J., Hirjak, D., Guban, V.:** Liečba bolestivých ochorení temporomandibulárního kloubu. Choroby hlavy a krku. 2002; 2, s. 9-13.
5. **Stiesch-Scholz, M., Tscherhetschek, H., Rossbach, A.:** Early begin of splint therapy improves treatment outcome in patients with temporomandibular point disc displacement without reduction. Clin Oral Investic. 2002; 6, s. 119-23.
6. **Wahlund, K., List, T., Larson, B.:** Treatment of temporomandibular disorders among adolescents: a comparison between occlusal appliance, relaxation training, and brief information. Acta Odontol. Scand., 61, 2003; s. 203-211.
7. **Wassell, R.V., Adams, N., Kelly, J., P.:** Treatment of temporomandibular disorders by stabilising splints in general dental practice: results after initial treatment, Brt. Dent. J., 197, 2004; s. 35- 41.
8. **Zajko, J., Satko, I., Hirjak, D.:** Liečba dysfunkcie temporomanibulárního kloubu náhusnou dlahou. Prakt.zub. Lék., 1990; 5, s. 151-154.
9. **Ekberg, E., Nilner, M.:** A 6- and 12- month follow-up of appliance therapy in TMD patients: a follow-up of a controlled trial. Int. J. Prosthodont., 15, 2002, s. 564- 570.
10. **Hersek, N., Canay, S., Caner, B., Ulutuncel, N.:** Bone SPECT imaging of patients with internal derangement of temporomandibular joint before and after splint therapy. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol Endod., 94, 2002; s. 576- 580.
11. **Krug, J., Jirousek, Z., Bartáková, V., Žižka, M.:** Lupání v čelistním kloubu-konzervativní terapie. Choroby hlavy a krku, 2001; 1, s. 5-10.
12. **Tanaka, E., del Pozo, R., Sugiyama, M., Tanne, K.:** Biomechanical response of retrodiscal tissue in the temporomandibular joint under compression. J. Oral Maxillofac Surg., 60, 2002; s. 546- 551.
13. **Fayed, M.M., El-Mangoury, N., H., El-Bokle, D.N., Betal, A.I.:** Occlusal splint therapy and magnetic resonance imaging. World J. Orthod., 2004; 5, s. 133-140.
14. **Kardoš, J.:** Terapie ochorenia temporomandibulárneho kloubu. Prakt.zub.Lék., 1991; 4, s. 122-125.

MUDr. Vladimír Machoň
Dětská stomatologická klinika LF UK
a FN Motol
V Úvalu 84
150 05 Praha 5
e-mail: machonv@post.cz
www. celistnikloub.cz

