

# VYŠETŘENÍ ZORNÉHO POLE U HYPERTENZNÍCH GLAUKOMŮ

Lešták J., Fůs M.

Oční klinika JL Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

*Čestné prohlášení:*

*Autoři prohlašují, že vznik a téma odborného sdělení a jeho zveřejnění není ve střetu zájmu a není podpořeno žádnou farmaceutickou firmou. Práce nebyla zadána jinému časopisu ani jinde otištěna.*

Do redakce doručeno dne: 17. 8. 2020

Přijato k publikaci dne: 11. 11. 2020



doc. MUDr. Ján Lešták, CSc, MSc,  
MBA, LLA, DBA, FEBO, FAOG  
Oční klinika JL Fakulty  
biomedicínského inženýrství  
ČVUT v Praze  
V Hůrkách 1296/10  
158 00 Praha 5 – Nové Butovice  
lestak@seznam.cz

## SOUHRN

**Cíle:** Cílem práce bylo ověřit, zda je nutné u počínajících hypertenzních glaukomů vyšetřit celé zorné pole.

**Materiál a metody:** Studie zahrnuje 16 pacientů s počínajícím glaukomem (skupina HTG) bez zjevných změn v zorném poli, a kontrolní skupinu 10 pacientů s normálním očním nálezem a hodnotou 1.0 zrakové ostrosti. Pacienti obou skupin podstoupili perimetrické vyšetření testem celého zorného pole a následně glaukomového zorného pole (rychlá prahová strategie pro oba testy). Pomocí Pearsonova korelačního koeficientu byly hodnoceny parametry pattern defect (PD) a overall defect (OD).

**Výsledky:** Ve skupině HTG byla pomocí Pearsonova korelačního koeficientu prokázána silná závislost mezi oběma parametry jak u PD ( $r = 0,74$ ), tak u OD ( $r = 0,63$ ). U kontrolní skupiny byla u PD prokázána střední ( $r = 0,54$ ) a u OD silná korelace ( $r = 0,636$ ).

**Závěr:** I když by se dalo očekávat, že změny v periférii zorného pole budou diagnostikované u HTG jako první, naše výsledky ukázaly, že tomu tak není. Proto je i v počínajících stádiích HTG dostačující pro dokumentaci průběhu onemocnění vyšetření glaukomovým programem.

**Klíčová slova:** hypertenzní glaukom, perimetr, pattern defect, overall defect, volba program

## SUMMARY

### VISUAL FIELD ASSESSMENT IN HYPERTENSION GLAUCOMA

**Aims:** The aim of the work is to verify the necessity of full-field perimetry test in incipient glaucoma.

**Material and methods:** The study included group of 16 incipient hypertension glaucoma (HTG group) patients without obvious changes in visual field and control group of 10 patients with normal ocular findings and value 1.0 of visual acuity. In both groups, full-field perimetry test was performed followed by a glaucoma perimetry test (rapid threshold strategy in both cases). Evaluated parameters were pattern defect (PD) and overall defect (OD) using Pearson's correlation coefficient.

**Results:** Strong correlation coefficient between PD ( $r = 0.74$ ) and OD ( $r = 0.63$ ) of both perimetry test were found in HTG group. Moderate correlation of PD ( $r = 0.54$ ) and strong correlation of OD ( $r = 0.64$ ) in control group.

**Conclusion:** Results of the study shows, that expected changes of peripheral visual field will be recorded first in HTG group, but opposite is true. Perimetry glaucoma test is for incipient glaucoma sufficient to document the course and the examination of glaucoma disease.

**Key words:** hypertension glaucoma, perimetry test, pattern defect, overall defect

Čes. a slov. Oftal., 77, 2021, No. 1, p. 22–26

## ÚVOD

Perimetrické vyšetření je v oftalmologické praxi nejčastěji indikováno u glaukomového onemocnění. Vzhledem k tomu, že se za nálezem na terči zrakového nervu může skrývat i jiná neurogení, hlavně útlaková leze zůstává toto vyšetření nenahraditelné v prvním kontaktu oftalmologa s pacientem.

Dosavadní doporučení k výběru rozsahu perimetrického vyšetření nerozlišovali mezi hypertenzním (HTG) a normotenzním glaukomem (NTG). Přibližně jednu

třetinu primárních glaukomů s otevřeným úhlem tvoří NTG [1,2].

Pro NTG jsou charakteristické změny v centrální části zorného pole a tyto mají hlubší pokles citlivosti [3,4,5,6,7].

Po zvýšení nitroočního tlaku (NOT) v experimentu dochází v sítnici k aktivaci mikroglií a makroglií [8]. Kromě této změny dochází i k přímé alteraci gangliových buněk sítnice. Dříve než se spustí proces apoptózy se samotná buňka brání smrti tím, že se zmenší nejen její povrch ale i dendritický strom. Více jsou poškozeny magnocelulární gangliové

buňky [9,10,11,12]. Tyto procesy probíhají nejen na úrovni sítnice ale i corpus geniculatum laterale (CGL) [12,13,14,15].

Touto problematikou se zabývali i Quigley a spol., kteří na kadaverozních glaukomových očích zjistili větší úbytek velkých gangliových buněk sítnice, přičemž perifoveální oblast zůstala intaktní [16,17]. Protože se magnocelulární gangliové buňky nacházejí v periférii sítnice, mělo by dojít při vyšetření zorného pole ke změnám právě v jeho pe-

riferii. Centrální část zorného pole by měla zůstat alespoň v časných stádiích intaktní. Proto bylo i cílem naší práce zjistit, zda u počínajícího hypertenzního glaukomového onemocnění stačí vyšetřit centrální část zorného pole (glaukomový program) nebo je nutné vyšetřit celé pole.

**Soubor a metodika vyšetření**

Do souboru bylo zařazeno sedm žen průměrného věku 53,6 let (34–70 let) a devět mužů průměrného

**Tabulka 1.** Souhrnná data

Glaukomatici					Kontroly				
sex-birth	Celé zorné ZP		Glaukomové ZP		sex-birth	Celé zorné ZP		Glaukomové ZP	
	PD PO/LO	OD PO/LO	PD PO/LO	OD PO/LO		PD PO/LO	OD PO/LO	PD PO/LO	OD PO/LO
F-1950	1,71	5,56	0,91	3,84	F-1959	3,10	3,10	3,60	2,18
	1,98	5,40	2,34	3,01		2,75	3,05	2,49	2,23
F-1956	7,10	0,43	3,15	3,83	F-1963	1,96	2,22	1,99	1,68
	5,46	2,98	3,61	3,34		3,15	3,36	2,30	2,08
F-1956	5,80	1,88	6,48	0,82	F-1964	3,24	2,51	3,10	3,20
	3,74	3,59	3,77	2,53		2,10	3,19	2,20	2,95
F-1960	1,71	3,31	2,63	2,07	F-1970	2,03	4,13	2,10	3,29
	2,01	4,06	2,19	3,57		2,46	4,67	2,20	3,80
F-1971	3,05	0,14	1,66	1,56	F-1973	2,76	3,54	1,26	2,06
	2,22	3,26	1,38	2,79		2,36	3,89	1,35	2,19
F-1986	1,97	1,98	2,16	0,70	F-1982	2,35	1,52	2,72	0,81
	2,11	1,67	1,92	1,18		2,69	2,65	2,35	0,70
F-1986	2,26	2,80	1,23	1,62	F-2004	2,40	3,31	1,28	1,80
	1,44	3,19	1,69	2,35		2,75	2,59	1,34	1,83
M-1943	2,60	4,68	1,89	3,61	M-1975	3,34	0,85	3,11	1,54
	4,08	3,99	2,12	3,36		3,22	0,97	3,79	1,38
M-1946	6,68	0,74	3,92	-0,53	M-1991	2,35	0,85	3,11	1,54
	6,34	2,05	6,65	2,01		3,22	0,97	3,79	1,38
M-1946	3,21	4,37	2,92	3,77	M-1992	2,76	1,62	1,80	2,54
	3,62	3,02	2,80	2,60		2,64	2,01	2,01	0,84
M-1952	4,15	2,42	2,05	4,23					
	4,13	5,03	2,51	4,33					
M-1954	3,00	4,24	2,17	2,85					
	3,09	4,19	2,46	3,43					
M-1955	2,07	4,42	1,79	3,84					
	2,07	5,04	2,34	3,01					
M-1955	2,73	5,55	1,99	3,32					
	2,46	4,20	1,78	3,29					
M-1964	2,20	3,21	1,80	1,97					
	1,85	2,28	2,10	1,52					
M-1976	2,43	3,15	1,63	2,58					
	3,25	3,40	3,43	3,17					

**Tabulka 2.** Pearsonův koeficient  $r$ : 0,00–0,19 velmi slabá, 0,20–0,39 slabá, 0,40–0,59 střední, 0,60–0,79 silná a 0,80–1,00 velmi silná

PEARSON'S R			
SKUPINA	ZP	Defect	
		Pattern	Overall
Glaukomatici	GI/Celé	0,740	0,630
Kontroly		0,543	0,636

věku 65,4 (44–77 let). Všichni měli verifikovaný hypertenzní glaukom v počátečním stadiu bez zjevných změn v zorných polích trvající alespoň tři roky. Kontrolní skupinu tvořilo sedm žen průměrného věku 39,7 let (26–61 let) a tři muži průměrného věku 40,7 let (29–45 let) s normálním očním nálezem a zrakovou ostrostí rovné 1,0.

U všech jsme vyšetřili celé zorné pole rychlou prahovou strategií (fast threshold) a následně po desetiminutovém odpočinku i glaukomovým programem na přístroji Medmont M700 (Medmont Pty Ltd, Victoria 3124, Australia). Glaukomový program se v rozsahu 0 až 22 stupňů temporálně a 0 až 50 stupňů nasálně vyšetřuje ve 104 bodech. Program k vyšetření celého pole je v rozsahu 0 až 50 stupňů a obsahuje 164 bodů. U každého zorného pole jsme hodnotili pattern defect (PD) a overall defect (OD). Ztráty fixace, falešně pozitivní i falešně negativní odpovědi byly u všech menší 10 %. Souhrnná data jsou uvedena v tabulce 1.

## VÝSLEDKY

Porovnáním naměřených hodnot PD při glaukomovém programu a celém zorném poli jsme u nemocných HTG zjistili silnou korelaci ( $r = 0,74$ ). Podobně silnou korelaci vykázal i OD ( $r = 0,64$ ). U zdravých jedinců PD středně koreloval u obou vyšetření ( $r = 0,54$ ). OD vykázal silnou korelaci ( $r = 0,636$ ). Tabulka 2.

## DISKUSE

U HTG dochází v počátečních stádiích onemocnění k nestabilním (přechodným) a izolovaným změnám v citlivosti vyšetřovaných bodů. Kvůli variabilitě prokázané v této studii, Ocular Hypertension Treatment Study (OHTS) změnila svůj protokol zorného pole pro potvrzení abnormality. Vyžadují se tři po sobě jdoucí abnormální zorné pole, u nichž vada není artefaktická, zahrnuje stejný index a abnormalita je na stejném místě. V této studii byly subjekty vyšetřeny programem 30-2 [18].

Co se týče výběru testu doporučují Heijl a Patella použít u glaukomu vyšetření centrálních 30 stupňů v počtu 54 vyšetřovaných bodů (Humphrey field analyser firmy Carl Zeiss Meditec SRN) [19]. Tento názor autoři sdílí i v dalším čtvrtém vydání Essential perimetry [20].

Na úvod této diskuse musíme uvést některá fakta o fyziologii a morfologii gangliových buněk sítnice a psychofyziologických vyšetření (perimetr). Počet fotoreceptorů (tyčinek a čípků), které jsou spojeny s jednou gangliovou buňkou tvoří receptivní pole. V sítnici oka se nachází několik typů gangliových buněk. Nejčastěji jsou ve spojitosti s glaukodem uváděny parvocelulární (P), magnocelulární (M) a koniocelulární (K).

**P** gangliové buňky sítnice jsou charakterizovány:

- velkým počtem (1 000 000),
- lokalizací více centrálně,
- nízkou axonální rychlostí vedení vzruchu,
- relativně malým receptivním polem (proto odpovídají i za centrální zrakovou ostrost),
- reagují na pomalu blikající světelné podněty,
- reagují na objekty o vysoké prostorové frekvenci a nízké kontrastní citlivosti,
- reagují na barevné podněty,
- nereagují na pohyblivé podněty [21],

**M** gangliové buňky sítnice jsou charakterizovány:

- malým počtem (100 000),
- lokalizací více periferně,
- vysokou axonální rychlostí vedení vzruchu,
- relativně velkým receptivním polem,
- reagují na rychle blikající světelné podněty,
- reagují na objekty o nízké prostorové frekvenci a vysoké kontrastní citlivosti,
- reagují na pohybující se podněty,
- nereagují na barevné podněty [21].

Objeví-li se v receptivním poli barva modrá, reagují **K** gangliové buňky [21].

Signifikantní změny v zorném poli byly spojeny se ztrátou 25–35 % gangliových buněk sítnice, přičemž přednostně umírali M buňky. Je ale nutné zdůraznit, že k vyšetření použili autoři program 30-2 (Humphrey field analyser) [22].

Tyto buněčné procesy mohou probíhat nezávisle na poškození nervových vláken gangliových buněk sítnice.

Rovněž bylo prokázáno, že RNFL předbíhají změny v zorných polích [23]. K podobným výsledkům jsme došli v jiné práci i my, kdy jsme optickou koherenční angiografií (OCTA) zjišťovali vessel density (VD) v peripapilární oblasti. Prokázali jsme, že VD má u HTG velmi malý vliv na změny v zorných polích. Podobně i RNFL na změny v zorném poli. Na změnách v RNFL má ale VD středně silný vliv [24]. V další práci jsme pomocí SD-OCT RTVue-100 porovnávali tloušťku vrstvy ganglion cells complex (GCC) a RNFL s druhostrannou altitudinální polovinou zorného pole. U HTG jsme nezjistili žádnou statisticky významnou korelaci [25]. Je nutno upozornit, že vyšetření GCC, RNFL a VD dávající informace o centrální části sítnice, a ne její periferní části. I to byl důvod, proč jsme chtěli u této diagnostické skupiny poznat v počátečních stádiích i periférii zorného pole.

K podobným závěrům došli i Na a spol. [26]. Zde je důležité také uvést, že u glaukomových očí s NOT nad 20 mmHg

došlo k výraznému poklesu makulární a papilární vessel density (VD) ( $p < 0,05$ ) [27].

Po úpravě NOT pozorovali In a spol. výrazné zlepšení VD v peripapilární oblasti nemocných s HTGI [28].

Změny ve vrstvě nervových vláken u očí s vyšším NOT jsou známé více než třicet let. Quigley a spol. a Sommer a spol. v experimentu na opicích prokázali, že vlákna M buněk atrofovali rychleji než ostatní, i když nebyly ušetřeny ani vlákna ostatních buněk [16,29].

Když se podíváme na funkce M gangliových buněk, tak zjistíme, že reagují na kontrast, strukturu a pohyb v receptivním poli. Z toho lze vyvodit i jejich větší citlivost na perimetrické vyšetření, kde je jako stimul použit pohyb [30], kontrast spojený s pohybem [31–34] a rychle blikající světelné podněty [34–36].

Bohužel, tyto technologie pro vyšetření zorného pole se běžně nepoužívají.

Tak jak je uvedeno v úvodu, dochází v experimentu po zvýšení NOT k alteraci hlavně magnocelulárních gangliových buněk sítnice. Tento závěr jsme verifikovali i u zdravého jedince, kde jsme elektrofyziologickým měřením prokázali, že po zvýšení NOT na 40 mmHg dochází k blokáde přenosu elektrických změn napětí právě na úrovni gangliových buněk sítnice. Podobně reagovali gangliové buňky u jiného pacienta s HTG, kde jsme po vysazení antiglaukomatik zjistili pokles amplitudy N50–N95 na obou očích [37].

## ZÁVĚR

Výsledky naší práce neprokázaly významnost vyšetření celého zorného pole u počínajících glaukomů. To ale neznamená, že začneme HTG léčit až při prvních změnách v zorném poli. Důležité je vyšetření RNFL a eventuálně VD, které předbíhají perimetrické změny.

## LITERATURA

- Bonomi L, Marchini G, Marraffa M. et al. Prevalence of glaucoma and intraocular pressure distribution in a defined population. The Egna-Neumarkt Study. *Ophthalmology*. 1998;105: 209–215.
- Klein BE, Klein R, Sponsel WE. et al. Prevalence of glaucoma. The Beaver Dam Eye Study. *Ophthalmology*. 1992;99:1499–1504.
- Araie M, Yamagami J, Suziki Y. Visual field defects in normal-tension and high-tension glaucoma. *Ophthalmology*. 1993;100:1808–1814.
- Levene RZ. Low tension glaucoma: a critical review and new material. *Surv Ophthalmol*. 1980;24:621–664.
- Zeiter JH, Shin DH, Juzych MS, Jarvi TS, Spoor TC, Zwas F. Visual field defects in patients with normal-tension glaucoma and patients with high-tension glaucoma. *Am J Ophthalmol*. 1992;114:758–763.
- Caprioli J, Spaeth GL. Comparison of visual field defects in the low-tension glaucomas with those in the high-tension glaucomas. *Amer J Ophthalmol*. 1984;97:730–737.
- Lestak J, Nutterova E, Bartosova L, Rozsival P. The visual field in normal tension glaucoma and hypertension glaucoma. *IJSR*. 2014;3: 49–51.
- Rojas B, Gallego BI, Ramírez AI. et al. Microglia in mouse retina contralateral to experimental glaucoma exhibit multiple signs of activation in all retinal layers. *J Neuroinflammation*. 2014;11:133. doi:10.1186/1742-2094-11-133.
- Glovinsky Y, Quigley HA, Dunkelberger GR. Retinal ganglion cell loss is size dependent in experimental glaucoma. *Invest Ophthalmol Vis Sci*. 1991;32:484–491.
- Morgan JE, Uchida H, Caprioli J. Retinal ganglion cell death in experimental glaucoma. *Br J Ophthalmol*. 2000;84:303–310.
- Naskar R, Wissing M, Thanos S. Detection of Early Neuron Degeneration and Accompanying Microglial Responses in the Retina of a Rat Model of Glaucoma. *Invest Ophthalmol Vis Sci*. 2002;43:2962–2968.
- Shou T, Liu J, Wang W, Zhou Y, Zhao K. Differential dendritic shrinkage of alpha and beta retinal ganglion cells in cats with chronic glaucoma. *Invest Ophthalmol Vis Sci*. 2003;44: 3005–3010.
- Smith EL, Chino YM, Harwerth RS, Ridder WH, Crawford MLJ, DeSantis L. Retinal inputs to the monkey's lateral geniculate nucleus in experimental glaucoma. *Clin Vision Sci*. 1993;8:113–139.
- Chaturvedi N, Hedley-Whyte ET, Dreyer EB. Lateral geniculate nucleus in glaucoma. *Am J Ophthalmol*. 1993;116:182–188.
- Vickers JC, Hof RP, Schumer RA, Wang RF, Podos SM, Morrison JH. Magnocellular and parvocellular visual pathways are both affected in a macaque model of glaucoma. *Aust N Z J Ophthalmol*. 1997;25:239–243.
- Quigley HA, Sanchez RM, Dunkelberger GR, L'Hernault NL, Baginski TA. Chronic glaucoma selectively damages large optic nerve fibers. *Invest Ophthalmol Vis Sci*. 1987;28:913–920.
- Quigley HA, Dunkelberger GR, Green WR. Retinal ganglion cell atrophy correlated with automated perimetry in human eyes with glaucoma. *Am J Ophthalmol*. 1989;107:453–464.
- Keltner JL, Johnson ChA, Quigg JM. et al. Confirmation of Visual Field Abnormalities in the Ocular Hypertension Treatment Study. *Arch Ophthalmol*. 2000;118:1187–1194.
- Heijl A, Patella VM. The field analyser primer. Essential perimetry. Third edition. Carl Zeiss Meditec Inc. 2002. ISBN: 0-9721560-0-3., s. 26
- Heijl A, Patella VM, Bengtsson B. The field analyser primer. Essential perimetry. Fourth edition. Carl Zeiss Meditec Inc. 2012. ISBN: 0-9884795-0-8, s. 29.
- Skalicky SE. Ocular and visual physiology. Clinical application. Springer Science+Business Media Singapore Pte Ltd., Australia 2016, Chapter 8, p. 123.
- Kerrigan-Baumrind LA, Quigley HA, Pease ME, Kerrigan DF, Mitchell RS. Number of ganglion cells in glaucoma eyes compared with threshold visual field tests in the same persons. *Invest Ophthalmol Vis Sci*. 2000;41:741–748.
- Klamann MK, Grünert A, Maier AK, Gonnermann J, Jousen AM, Huber KK. Comparison of functional and morphological diagnostics in glaucoma patients and healthy subjects. *Ophthalmic Res*. 2013;49:192–198.
- Zakova M, Lestak J, Fus M, Maresova K. OCT Angiography and Visual Field in Hypertensive and Normotensive Glaucoma. *Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub*. 2020;164 – in press
- Lešták J, Pitrová Š. „Ganglion cells komplex“ a vrstva nervových vláken u hypertenzních a normotenzních glaukomů. [Ganglion Cells Complex“ and Retinal Nerve Fiber Layer in Hypertensive and Normal-Tension Glaucoma]. *Cesk Slov Oftalmol*. 2016;72:199–203. Czech.
- Na JH, Lee K, Lee JR, Baek S, Yoo SJ, Kook MS. Detection of macular ganglion cell loss in preperimetric glaucoma patients with localized retinal nerve fibre defects by spectral-domain optical coherence tomography. *Clin Exp Ophthalmol*. 2013;41: 870–880.
- Ma ZW, Qiu WH, Zhou DN, Yang WH, Pan XF, Chen H. Changes in vessel density of the patients with narrow anterior chamber after an acute intraocular pressure elevation observed by OCT angiography. *BMC Ophthalmol*. 2019;19:132. doi: 10.1186/s12886-019-1146-6
- In JH, Lee SY, Cho SH, Hong YJ. Peripapillary Vessel Density Reversal after Trabeculectomy in Glaucoma. *J Ophthalmol*. 2018;26:8909714. doi: 10.1155/2018/8909714. eCollection 2018.
- Sommer A, Katz J, Quigley HA, Miller NR, Robin AL, Richter RC, Witt KA. Clinically detectable nerve fiber atrophy precedes the onset of glaucomatous field loss. *Arch Ophthalmol*. 1991;109:77–83.

30. Bosworth CF, Sample PA, Weinreb RN. Motion perception thresholds in areas of glaucomatous visual field loss. *Vision Res.* 1997;37:355–364.
31. Johnson CA, Samuels SJ. Screening for glaucomatous visual field loss with frequency-doubling perimetry. *Invest Ophthalmol Vis Sci.* 1997;38:413–425.
32. Arend KO, Plange N. Diagnostic approaches for early detection of glaucoma progression. *Klin Monbl Augenheilkd.* 2006;223:194–216.
33. Ferreras A, Polo V, Larrosa JM. et al. Can frequency-doubling technology and short-wavelength automated perimetries detect visual field defects before standard automated perimetry in patients with preperimetric glaucoma? *J Glaucoma.* 2007;16:372–383.
34. Nomoto H, Matsumoto C, Takada S. et al. Detectability of glaucomatous changes using SAP, FDT, flicker perimetry, and OCT. *J Glaucoma.* 2009;18:165–171.
35. Horn FK, Jonas JB, Korth M, Jünemann A, Gründler A. The full-field flicker test in early diagnosis of chronic open-angle glaucoma. *Am J Ophthalmol.* 1997;123:313–319.
36. Horn FK, Tornow RP, Jünemann AG, Laemmer R, Kremers J. Perimetric measurements with flicker-defined form stimulation in comparison with conventional perimetry and retinal nerve fiber measurements. *Invest Ophthalmol Vis Sci.* 2014;55:2317–2323.
37. Lešták J, Fůs M. Neuroprotection in glaucoma-electrophysiology. *Exp Ther Med.* 2020;19:2401–2405.