dermatologie_2.09:Sestava 1 2.4.2009 9:33 Stránka 86
proLékaře.cz | 4.12.2026

DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ – KONTROLNÍ TEST

ATOPICKÁ DERMATITIDA V ROCE 2009

1. **Společně rysy pro všechny formy atopické dermatitidy jsou:**
   a) pruritus, chronická dermatitida, pozitivita specifických IgE
   b) pruritus, chronická dermatitida, xeróza
   c) pruritus, chronická dermatitida, pozitivní rodinná anamnéza atopie
   d) pruritus, chronická dermatitida, alergie

2. **Proaktivní léčba atopické dermatitidy znamená:**
   a) intervalová léčba
   b) léčba pouze při zhoršení atopické dermatitidy
   c) včasná léčba lokálními kortikoidy či imunomodulátory při prvních příznacích exacerbace
   d) druh léčby předcházející před aktivní léčbou

3. **Pozitivita specifických IgE:**
   a) je spojena s intrinzickou fází (formou) atopické dermatitidy
   b) predikuje vždy těžký průběh
   c) výše hodnot koreluje se závažností atopické dermatitidy
   d) nemusí být přítomna

4. **Atopická dermatitida se dědí více:**
   a) po matce
   b) po otci
   c) není rozdíl v dědičnosti ohledně pohlaví rodičů
   d) při mladším věku rodičů

5. **Zlatý stafylokok na kůži u atopické dermatitidy:**
   a) je neškodným symbiontem
   b) vede k většímu pruritu a chronicitě atopické dermatitidy
   c) nemá vliv na snížení účinnosti lokálních kortikoidů
   d) je přítomen u většiny pacientů

6. **Alokineze u atopické dermatitidy znamená:**
   a) nekoordinované škrábavé pohyby dané poruchou pohybového centra
   b) pruritus u atopické dermatitidy vyvolaný pohybem
   c) reagování atopika na různé podněty svěděním
   d) souhyby končetin při svědění

7. **Lokální kortikosteroidy u atopické dermatitidy:**
   a) začíná se vždy slabším a při malém efektu se přechází na silnější
   b) se smí používat pouze slabé či středně silné
   c) výběr síly se individuálně řídí podle závažnosti, věku a lokalizace
   d) raději slabší po delší dobu než silnější po krátkou dobu

8. **Lokální imunomodulátory u atopické dermatitidy:**
   a) jsou vhodné zejména k udržovací léčbě
   b) se smí používat pouze intermitentně
   c) nesmí se kombinovat s očkováním, i když se aplikují mimo místo vakcinace a na malou plochu
   d) při aktivaci je třeba aplikace 2krát/den

9. **Lokální antibiotika u atopické dermatitidy se používají:**
   a) kontinuálně či intermitentně k redukci stafylokoků na kůži
   b) cíleně na základě zjištěné citlivosti ze stěru na bakteriologické vyšetření
   c) pouze při klinicky zjevné impetiginizaci
   d) jen v kombinaci s antibiotiky celkovými

10. **Vhodná celková imunosupresiva pro dlouhodobou léčbu velmi těžké atopické dermatitidy jsou:**
   a) cyklosporin A intermitentně
   b) kortikosteroidy kontinuálně v nízkých dávkách
   c) methotrexát v pulzním dávkování 1krát týdně
   d) cyklofosfamid kontinuálně v nízkých dávkách

*Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte **6 kreditů** kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Ti z vás, kteří chtějí být zařazeni do slosování o ceny 84. ročníku časopisu roku 2009, nechť zašlou správné odpovědi na kontrolní test na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.*

Odpovědi na otázky kontrolního testu k článku publikovaném v č. 1/2009:
MUDr. J. Říčař: Kožní onemocnění sportovců
Správné odpovědi: 1b, 2bc, 3c, 4ad, 5bd, 6ad, 7bc, 8b, 9ad, 10bd