

DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ – KONTROLNÍ TEST

KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE

1. Hojení per secundam je vhodné zejména:

- a) u větších ran
- b) u ran na konkávních plochách
- c) u ran na konvexních plochách
- d) na křídle nosním

2. Vlákno pevnosti 6-0 je zvlášť vhodné:

- a) u ran s větším napětím okrajů
- b) u ran ve kšticí
- c) u velkých ran na trupu
- d) v oblasti očních víček

3. Příčinou zhnisání a následné dehiscence kožní rány je nejčastěji:

- a) nedodržení zásad asepse
- b) erysipel rány
- c) sutura pod velkým napětím okrajů
- d) špatně zvolený šicí materiál

4. Jednoduchý uzlový steh:

- a) je nejčastěji užívaným kožním stehem
- b) nezanechává na kůži „žebříček“
- c) obtížně se odstraňuje
- d) není vhodný ve kšticí

5. Pokračovací intradermální steh:

- a) je vhodný u širokých ran
- b) je vhodný nad klouby končetin
- c) je kosmeticky nepříznivý
- d) je kosmeticky příznivý

6. Nevýhodou místního kožního laloku je:

- a) že se přesouvá kůže z blízkého okolí rány
- b) že zanechává na kůži záplatu
- c) větší riziko krvácení
- d) že ho nelze použít v obličejí

7. Dermoepidermální štěp:

- a) obsahuje epidermis a celé korium
- b) je označením xenotransplantátu
- c) obsahuje epidermis a část koria
- d) rána po jeho odběru se uzavírá primární suturou

8. Vaporizační CO₂ laser je vhodný:

- a) na resurfacing obličeje (vyhlazování vrásek)
- b) na odstraňování naevus flammeus
- c) k depilaci
- d) k podpoře hojení u chronických ran

9. Intenzivní pulzní světlo:

- a) má koherentní paprsky
- b) je polychromatické
- c) užívá se jako světelný skalpel
- d) není vhodné k depilaci

10. Botulotoxin blokuje přenos vzruchů, jehož mediátorem je:

- a) adrenalin
- b) noradrenalin
- c) epinefrin
- d) acetylcholin

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 6 kreditů kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Ti z vás, kteří chtějí být zařazeni do slosování o ceny 85. ročníku časopisu roku 2010, necht' zašlou správné odpovědi na kontrolní test na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu k článku publikovaném v č. 6/2009:

Lacina, L.: Sarkoidóza

Správné odpovědi: 1d; 2a,b,d; 3a,c,d; 4a,b; 5a,b,c; 6b,c; 7a; 8a,d; 9b,c,d; 10b,c,d