D1_2010:Sestava 1 5.2.2010 10:06 Stránka 13
proLékaře.cz | 13.11.2026

DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ – KONTROLNÍ TEST

KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE

1. Hojení per secundam je vhodné zejména:
a) u větších ran
b) u ran na konkávních plochách
c) u ran na konvexních plochách
d) na křídle nosním

2. Vlákno pevnosti 6-0 je zvlášť vhodné:
a) u ran s větším napětím okrajů
b) u ran ve kštici
c) u velkých ran na trupu
d) v oblasti očních víček

3. Příčinou zhnisání a následné dehiscence kožní rány je nejčastěji:
a) nedodržení zásad asepse
b) erysipel rány
c) sutura pod velkým napětím okrajů
d) špatně zvolený šicí materiál

4. **Jednoduchý uzlový steh:**
a) je nejčastěji užívaným kožním stehem
b) nezanechává na kůži „žebříček“
c) obtížně se odstraňuje
d) není vhodný ve kštici

5. Pokračovací intradermální steh:
a) je vhodný u širokých ran
b) je vhodný nad klouby končetin
c) je kosmeticky nepříznivý
d) je kosmeticky příznivý

6. Nevýhodou místního kožního laloku je:
a) že se přesouvá kůže z blízkého okolí rány
b) že zanechává na kůži záplatu
c) větší riziko krvácení
d) že ho nelze použít v obličeji

7. Dermoepidermální štěp:
a) obsahuje epidermis a celé korium
b) je označením xenotransplantátu
c) obsahuje epidermis a část koria
d) rána po jeho odběru se uzavírá primární suturou

8. Vaporizační CO_2 laser je vhodný:
a) na resufacing obličeje (vyhlazování vrásek)
b) na odstraňování naevus flammeus
c) k depilaci
d) k podpoře hojení u chronických ran

9. Intenzivní pulzní světlo:
a) má koherentní paprsky
b) je polychromatické
c) užívá se jako světelný skalpel
d) není vhodné k depilaci

10. Botulotoxin blokuje přenos vzruchů, jehož mediátorem je:
a) adrenalin
b) noradrenalin
c) epinefrin
d) acetylcholin

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 6 kreditů kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Ti z vás, kteří chtějí být zařazeni do slosování o ceny 85. ročníku časopisu roku 2010, nechť zašlou správné odpovědi na kontrolní test na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu k článku publikovaném v č. 6/2009:
Lacina, L.: Sarkoidóza
Správné odpovědi: 1d; 2a,b,d; 3a,c,d; 4a,b; 5a,b,c; 6b,c; 7a; 8a,d; 9b,c,d; 10b,c,d