
DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ – KONTROLNÍ TEST

SOUČASNÉ TRENDY A NOVÉ MOŽNOSTI V LÉČBĚ MELANOMU

- 1. Nejvýznamnější nezávislý prognostický faktor u melanomu je:**
 - a) hloubka invaze do koria
 - b) tloušťka nádoru měřená v mm
 - c) klinicky popisovaná ulcerace nádoru
 - d) absolutní počet mitóz
- 2. Vyšetření sentinelové uzliny je:**
 - a) elektivní disekce lymfatických uzlin
 - b) léčebná metoda odstraňující postižené uzliny
 - c) vyšetřovací stagingová metoda
 - d) indikována pouze u nemocných s ulcerovanými nádory
- 3. K adjuvantní léčbě jsou indikovány melanomy:**
 - a) všechny od stadia II B
 - b) všechny od stadia III A
 - c) všechny s makroskopicky postiženými uzlinami
 - d) pouze ve stadiích II B–III C
- 4. Satelitní metastázy jsou:**
 - a) drobná ložiska do vzdálenosti 2 cm od nádoru
 - b) drobná ložiska v uzlinách do velikosti 2 mm
 - c) 2 cm velká ložiska mezi nádorem a regionálními uzlinami
 - d) metastatická ložiska do velikosti 2 cm
- 5. Nejčastější adjuvantní léčbou melanomu je:**
 - a) chemoterapie
 - b) pouze imunoterapie
 - c) kombinovaná chemoimunoterapie
 - d) pouze léky zkoušené v klinických studiích
- 6. Adjuvantní imunoterapie s IFN α :**
 - a) je účinnější při vyvolání autoimunity
 - b) významně prodlužuje přežívání nemocných s melanomem
 - c) je indikována pouze u ulcerovaných nádorů
 - d) má minimum vedlejších účinků
- 7. V léčbě metastazujícího melanomu:**
 - a) je indikována pouze chemoterapie a aktinoterapie
 - b) většinou selhávají všechny standardní léčebné postupy
 - c) má chemoimunoterapie nejméně léčebných odpovědí
 - d) je využívána vysoká citlivost k chemoterapii
- 8. Při imunitních reakcích vůči nádoru:**
 - a) je výhodou tolerance k nádorovým buňkám
 - b) je nutné zesílit expresi receptoru CTLA-4
 - c) je problémem imunoprese vyvolaná nádorem
 - d) nevznikají nikdy autoimunitní reakce
- 9. Účinnost anti CTLA-4 u metastazujícího melanomu**
 - a) hodnotíme podle stejných kritérií jako účinnost chemoterapie
 - b) procento léčebných odpovědí je výrazně vyšší než u chemoterapie
 - c) léčebné odpovědi trvají déle
 - d) k hodnocení používáme RECIST kritéria
- 10. Nejúčinnější léčba melanomu je:**
 - a) chemoterapie metastazujícího melanomu
 - b) včasná diagnóza počínajícího melanomu
 - c) léčba vakcínami
 - d) cílená léčba

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 6 kreditů kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakci jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Ti z vás, kteří chtějí být zařazeni do slosování o ceny 85. ročníku časopisu roku 2010, nechť zašlou správné odpovědi na kontrolní test na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu k článku publikovaném v č. 3/2010:

Bučková H.: Mastocytózy u dětí

Správné odpovědi: 1c, 2b, 3d, 4d, 5a,d, 6b,c, 7d, 8b, 9c, 10a