proLékaře.cz | 13.11.2026

DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ – KONTROLNÍ TEST

M. DARIER A PŘÍBUZNÉ DERMATÓZY

1. Mutace kalciových ATP-áz byla prokázána v etiopatogeneze:
a) M. Darier a m. Grover
b) M. Darier a m. Hailey-Hailey
c) M. Hailey-Hailey a m. Grover
d) M. Grover a acrokeratosis verruciformis Hopf

2. Akantolýza u m. Darier a m. Hailey-Hailey:
a) je následkem dysfunkce desmozomů
b) je podmíněna autoprotilátkami
c) se zhorší při mechanické zátěži kůže
d) je potencována působky produkovanými *Staphylococcus aureus*

3. Predilekční lokalizací u m. Darier jsou:
a) extenzorové plochy končetin
b) genitál a sliznice
c) seboroické a intertriginózní oblasti
d) dlaně a chodidla

4. K charakteristickými projevům m. Darier patří:
a) kónické papuly s pevně lnoucím keratotickým čepem
b) distální zářez tvaru V na nehtové ploténce
c) anulární erytematózní ložiska
d) ploché papuly barvy kůže na dorzu rukou

5. Na prvním místě v systémové terapii m. Darier jsou:
a) kortikosteroidy
b) metotrexát
c) retinoidy
d) antibiotika

6. K charakteristickým projevům m. Hailey-Hailey nepatří:
a) obraz prašné silnice vysychající po dešti ve velkých záhybech
b) mokvající plochy s krustoskvamami
c) mikroskopicky obraz rozpadající se cihlové zdi
d) mikroskopicky přítomnost četných corps ronds

7. M. Hailey-Hailey si nemůžeme splést s:
a) pemphigus vegetans
b) M. Darier
c) condylomata acuminata
d) lichen sclerosus et atrophicus

8. M. Grover:
a) nemá nikdy v klinickém obraze puchýřky
b) je častější u žen
c) je lokalizován především sakrálně a na šíji
d) je charakteristický svěděním

9. V terapii m. Grover a m. Hailey-Hailey:
a) není důležité vyvarovat se pocení
b) se mohou uplatnit lokální antibiotika
c) se mohou uplatnit celkové retinoidy
d) se často využívá metotrexát

10. O m. Grover neplatí:
a) histologicky může připomínat pemphigus vulgaris
b) vždy mizí do několika měsíců
c) klinicky může připomínat scabies
d) vyskytuje se častěji u hospitalizovaných pacientů

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 6 kreditů kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2), vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu publikovaném v č. 5/2010:
Jirásková M.: Rentgenoterapie – možnosti jejího použití v dermatologii
Správné odpovědi: **1c, 2c, 3a, 4c, 5c,d, 6a,b, 7a,b,d, 8c, 9c, 10b.**