

## DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ – KONTROLNÍ TEST

1. **Nejčastější neutrofilní alopecie je:**
  - a) Perifolliculitis abscedens et suffodiens
  - b) Acne keloidalis
  - c) Folliculitis decalvans
  - d) Pseudopelade Brocq
2. **Biopsie u jizvící alopecie:**
  - a) provádíme vždy ze středu alopetického ložiska
  - b) bioptickou jehlu (průbojník) orientujeme kolmo ke kůži
  - c) bioptickou jehlu (průbojník) orientujeme paralelně s vlasovými folikuly
  - d) přímá imunofluorescence se neprovádí
3. **Přímá imunofluorescence vykazuje charakteristický nález u:**
  - a) lichen planopilaris
  - b) diskoidního lupus erythematoses
  - c) pseudopelade Brocq
  - d) folliculitis decalvans
4. **Pro aktivitu jizvící alopecie svědčí pozitivní trakční test z okraje ložiska s:**
  - a) anagenními vlasy
  - b) katagenními vlasy
  - c) telogenními vlasy
  - d) trakční test nemá význam
5. **Popisovanou komplikací diskoidního lupus erythematoses je:**
  - a) maligní melanom
  - b) bazaliom
  - c) spinaliom
  - d) dermatofibrosarkoma protuberans
6. **U diskoidního lupus erythematoses jsou první linií celkové léčby:**
  - a) retinoidy
  - b) antimalarika
  - c) kortikosteroidy
  - d) metotrexát
7. **Frontální jizvící alopecie:**
  - a) je onemocněním převážně žen po menopauze
  - b) je onemocněním převážně mladých žen
  - c) se vyskytuje i u mužů
  - d) postihuje výhradně křtici
8. **U pseudopelade Brocq:**
  - a) je většinou výrazný erytém ložisek
  - b) rozložení ložisek někdy připomíná „stopy ve sněhu“
  - c) bývá provázána vznikem atrofických jizev
  - d) bývá provázána vznikem hypertrofických jizev
9. **Folliculitis decalvans:**
  - a) je onemocněním vyššího věku
  - b) je provázána vznikem pustul
  - c) postihuje často vousy
  - d) vede často ke vzniku hypertrofických jizev
10. **U folliculitis decalvans se v celkové léčbě doporučují:**
  - a) antibiotika
  - b) antimalarika
  - c) sulfony
  - d) zinek

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity\* kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi pošlete na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu publikovaném v č. 2/2012:

**Fikrle T., Drlík L.: Dermatoskopické vyšetření v neobvyklých indikacích**

**Správné odpovědi: 1d, 2c, 3b, 4a, 5b, 6b, 7a, 8a, 9d, 10c.**

\*Podle přílohy č. 1 k § 4 odst. 1 písm. f) a § 11 Stavovského předpisu ČLK č. 16 – platné od 25. 1. 2012.