proLékaře.cz | 18.11.2026

DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ – KONTROLNÍ TEST

1. **Nejčastější neutrofilní alopecie je:**
   a) Perifolliculitis abscedens et suffodiens
   b) Acne keloidalis
   c) Folliculitis decalvans
   d) Pseudopelade Broq

2. **Biopsie u jizvící alopecie:**
   a) provádíme vždy ze středu alopetického ložiska
   b) bioptickou jehlu (průbojník) orientujeme kolmo ke kůži
   c) bioptickou jehlu (průbojník) orientujeme paralelně s vlasovými folikuly
   d) přímá imunofluorescence se neprovádí

3. **Přímá imunofluorescence vykazuje charakteristický nález u:**
   a) lichen planopilaris
   b) diskoidního lupus erythematodes
   c) pseudopelade Broq
   d) folliculitis decalvans

4. **Pro aktivitu jizvící alopecie svědčí pozitivní trakční test z okraje ložiska s:**
   a) anagenními vlasy
   b) katagenními vlasy
   c) telogenními vlasy
   d) trakční test nemá význam

5. **Popisovanou komplikací diskoidního lupus erythematodes je:**
   a) maligní melanom
   b) bazaliom
   c) spinaliom
   d) dermatofibrosarkoma protuberans

6. **U diskoidního lupus erythematodes jsou první linií celkové léčby:**
   a) retinoidy
   b) antimalarika
   c) kortikosteroidy
   d) metotrexát

7. **Frontální jizvící alopecie:**
   a) je onemocněním převážně žen po menopauze
   b) je onemocněním převážně mladých žen
   c) se vyskytuje i u mužů
   d) postihuje výhradně kštici

8. **U pseudopelade Brocq:**
   a) je většinou výrazný erytém ložisek
   b) rozložení ložisek někdy připomíná „stopy ve sněhu“
   c) bývá provázena vznikem atrofických jizev
   d) bývá provázena vznikem hypertrofických jizev

9. **Folliculitis decalvans:**
   a) je onemocněním vyššího věku
   b) je provázena vznikem pustul
   c) postihuje často vousy
   d) vede často ke vzniku hypertrofických jizev

10. **U folliculitis decalvans se v celkové léčbě doporučují:**
    a) antibiotika
    b) antimalarika
    c) sulfony
    d) zinek

Pozn. **Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity* kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi posílejte na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.**

Odpovědi na otázky kontrolního testu publikovaném v č. 2/2012:
Fikrle T., Drlík L.: Dermatoskopické vyšetření v neobvyklých indikacích
Správné odpovědi: 1d, 2c, 3b, 4a, 5b, 6b, 7a, 8a, 9d, 10c.

*Podle přílohy č. 1 k § 4 odst. 1 písm. f) a § 11 Stavovského předpisu ČLK č. 16 – platné od 25. 1. 2012.