

**DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ – KONTROLNÍ TEST**

1. **Pruritus esenciální vyvolávají:**
  - a) histaminoliberatory potravin
  - b) notalgia paresthetica
  - c) příčina není známa
  - d) aditiva potravin
2. **Základní laboratorní vyšetření u pacientů s pruritem zahrnuje:**
  - a) jaterní testy
  - b) intradermální testy pro reakce zprostředkované IgE
  - c) funkční testy štítné žlázy
  - d) nefrologické vyšetření
3. **U chronického pruritu se vyskytují na kůži:**
  - a) hypopigmentace
  - b) hyperpigmentace
  - c) jizvy
  - d) prurigo nodularis
4. **Vazebná místa pro neuromediátory nemají:**
  - a) Merkelovy buňky
  - b) endotelie drobných cév
  - c) leukocyty
  - d) Langhansovy mnohояaderné buňky
5. **Pruritus anogenitalis může vyvolat:**
  - a) chlamydiová proktitida
  - b) syfilis
  - c) hormonální změny
  - d) fixní lékový exantém
6. **Neurogenní pruritus není typický u:**
  - a) scabies
  - b) mozkové mrtvice
  - c) polycythemia vera
  - d) sclerosis multiplex
7. **Nemocný s pruritem obvykle pociťuje úlevu:**
  - a) ochlazením kůže
  - b) v teple
  - c) ve spánku
  - d) bolestivým škrábáním
8. **Doporučené rozšířené vyšetření u systémového pruritu zahrnuje:**
  - a) vyšetření hladin komplementu
  - b) antithyreoidální protilátky
  - c) elektroforézu bílkovin v séru
  - d) kryoproteiny
9. **Lokální léčba pruritu zahrnuje:**
  - a) capsaicin
  - b) inhibitory calcineurinu
  - c) opioidy
  - d) homeopatika
10. **Diferenciální diagnostika generalizovaného pruritu zahrnuje:**
  - a) taktilní halucinózu
  - b) syfilis
  - c) infekci AIDS
  - d) urémii

Pozn. Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity\* kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakci jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi pošlete na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu publikovaného v č. 3/2012:

Říčař J.: Nejčastější primární jizvící alopecie

Správné odpovědi: 1c, 2c, 3ab, 4a, 5c, 6b, 7ac, 8bc, 9bd, 10acd

\*Podle přílohy č. 1 k § 4 odst. 1 písm. f) a § 11 Stavovského předpisu ČLK č. 16 – platné od 25. 1. 2012.