proLékaře.cz | 11.11.2026

DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ – KONTROLNÍ TEST

1. **Pruritus esenciální vyvolávají:**
   a) histaminoliberatory potravin
   b) notalgia paresthetica
   c) příčina není známa
   d) aditiva potravin

2. **Základní laboratorní vyšetření u pacientů s pruritem zahrnuje:**
   a) jaterní testy
   b) intradermální testy pro reakce zprostředkované IgE
   c) funkční testy štítné žlázy
   d) nefrologické vyšetření

3. **U chronického pruritu se vyskytují na kůži:**
   a) hypopigmentace
   b) hyperpigmentace
   c) jizvy
   d) prurigo nodularis

4. **Vazebná místa pro neuromediátory nemají:**
   a) Merkelovy buňky
   b) endotelie drobných cév
   c) leukocyty
   d) Langhansovy mnohojaderné buňky

5. **Pruritus anogenitalis může vyvolat:**
   a) chlamydiová proktitida
   b) syfilis
   c) hormonální změny
   d) fixní lékový exantém

6. **Neurogenní pruritus není typický u:**
   a) scabies
   b) mozkové mrtvice
   c) polycythemia vera
   d) sclerosis multiplex

7. **Nemocný s pruritem obvykle pociťuje úlevu:**
   a) ochlazením kůže
   b) v teple
   c) ve spánku
   d) bolestivým škrábáním

8. **Doporučené rozšířené vyšetření u systémového pruritu zahrnuje:**
   a) vyšetření hladin komplementu
   b) antithyreoidální protilátky
   c) elektroforézu bílkovin v séru
   d) kryoproteiny

9. **Lokální léčba pruritu zahrnuje:**
   a) capsaicin
   b) inhibitory calcineurinu
   c) opioidy
   d) homeopatika

10. **Diferenciální diagnostika generalizovaného pruritu zahrnuje:**
    a) taktilní halucinózu
    b) syfilis
    c) infekci AIDS
    d) urémii

Pozn. **Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity* kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi posílejte na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.**

Odpovědi na otázky kontrolního testu publikovaného v č. 3/2012:
Říčař J.: Nejčastější primární jizvící alopecie
Správné odpovědi: 1c, 2c, 3ab, 4a, 5c, 6b, 7ac, 8bc, 9bd, 10acd

*Podle přílohy č. 1 k § 4 odst. 1 písm. f) a § 11 Stavovského předpisu ČLK č. 16 – platné od 25. 1. 2012.