proLékaře.cz | 24.11.2026

DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ – KONTROLNÍ TEST

1. **Dermatoskopické vyšetření:**
   a) zpřesňuje diagnózu u velmi malých melanocytárních lézí
   b) zvyšuje počet excizí melanocytárních lézí
   c) je přínosné zejména u nodulárních melanomů
   d) odliší bazaliomy od spinaliomů

2. **Pro přesnou T klasifikaci melanomu jsou nezbytné následující údaje:**
   a) Breslow, Clark, pigmentace, počet mitóz na mm^2
   b) Breslow, Clark jen v případě ulcerace nádoru, pigmentace, počet mitóz na mm^2
   c) Breslow, Clark jen u nádorů tenčích než 1mm, pigmentace, počet mitóz na mm^2
   d) Breslow, Clark jen u nádorů tenčích než 1mm, ulcerace, počet mitóz na mm^2

3. **Indikací k vyšetření sentinelové uzliny je**
   a) tloušťka nádoru menší než 1 mm
   b) ulcerace nádoru
   c) radikální excize primárního nádoru
   d) hmatná zvětšená uzlina

4. **Jako mikrometastázy označujeme:**
   a) metastázy menší než 0,1 mm
   b) drobná nádorová ložiska v okolí primárního nádoru
   c) nádorová ložiska v sentinelové uzlině
   d) drobné metastázy v plicích nebo játrech

5. **Pegylovaný interferon alfa:**
   a) je nové označení klasického interferonu alfa
   b) má vyšší toxicitu než klasické interferony alfa
   c) vylučuje se rychleji z organismu
   d) aplikuje se pouze 1krát týdně

6. **Která z následujících možností nejlépe odpovídá účinkům ipilimumabu**
   a) blokuje receptor CTLA-4 a tím snižuje aktivitu a proliferaci T lymfocytů
   b) blokuje receptor CTLA-4 a tím zvyšuje aktivitu a proliferaci T lymfocytů
   c) brání vzniku autoimunitních reakcí
   d) léčebný účinek se objevuje velmi rychle

7. **Nejčastější nežádoucí účinky ipilimumabu jsou:**
   a) kožní a gastrointestinální toxicita
   b) hematologická toxicita
   c) únava a psychické problémy
   d) bolesti kloubů

8. **Která z následujících možností nejlépe odpovídá účinkům vemurafenibu**
   a) je účinný pouze u slizničních a očních melanomů
   b) způsobuje aktivaci MAPK signální dráhy
   c) je účinný selektivní inhibitor BRAF mutace
   d) léčebný účinek se objevuje až v odstupu řady týdnů či měsíců

9. **Mezi nežádoucí účinky vemurafenibu většinou nepatří:**
   a) vysoké teploty
   b) bolesti kloubů
   c) vznik spinocelulárních karcinomů
   d) kožní toxicita

10. **Intervaly sledování nemocných po operaci melanomu by měly být určovány:**
    a) výsledky základních hematologických vyšetření
    b) kožním fototypem a rodinnou anamnézou
    c) výsledky PET/CT vyšetření
    d) stadiem onemocnění v době stanovení diagnózy

Pozn. **Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity* kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi posílejte na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.**

Odpovědi na otázky kontrolního testu publikovaném v č. 4/2012:
Pánková R.: Diferenciální diagnostika pruritu
Správné odpovědi: 1c, 2acd, 3abcd, 4d, 5ac, 6bd 7ad, 8abcd, 9abc, 10acd.

*Podle přílohy č. 1 k § 4 odst. 1 písm. f) a § 11 Stavovského předpisu ČLK č. 16 – platné od 25. 1. 2012