proLékaře.cz | 13.11.2026

DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ
KONTROLNÍ TEST

1. Desmoplastický névus mívá barvu:
a) černou
b) světle hnědou či barvy kůže
c) šedomodrou
d) tmavě hnědou

2. Klonální névus je tvořen:
a) skupinou odlišných, nepigmentovaných melanocytů v junkční složce, proto není klinicky ničím nápadný
b) skupinou odlišných, silně pigmentovaných melanocytů v junkční složce, proto je klonus černý
c) skupinou odlišných, nepigmentovaných melanocytů v dermální složce, proto není klonus klinicky ničím nápadný
d) skupinou odlišných, pigmentovaných melanocytů a melanofágů v dermální složce, proto se klonus jeví klinicky jako šedomodrý či modročerný

3. Kombinovaný névus vzniká:
a) jen u dětí
b) jen u dospělých
c) v jakémkoliv věku
d) jen u starších osob

4. Meyersonův névus:
a) je standardní névocelulární névus s ekzematózním lemem
b) je cytologicky atypický névus s rizikem melanomu
c) je névus s bílým halo
d) je névus s regresí

5. Hluboko penetrující névus:
a) je modrý névus sahající k subcutis
b) je silně pigmentovaný, převážně dermální névus připomínající klinicky névus modrý
c) je hluboko sahající névocelulární névus
d) je typický prekurzor melanomu

6. Névus Spitzové většinou nevzniká:
a) u mladších žen na končetinách
b) do 20 let věku
c) u dospělých mužů na zádech
d) jako solitární léze

7. Névoidní melanom připomíná histologicky:
a) dysplastický névus
b) névus Spitzové
c) junkční névus
d) intradermální névus

8. Desmoplastický melanom:
a) je tvořen většinou silně pigmentovanými melanocyty a fibrózou
b) je tvořen většinou nepigmentovanými melanocyty a fibrózou
c) je klinicky nápadný a proto zachycen včas
d) je melanom vznikající častěji v desmoplastickém névu

9. MELTUMP mívá rysy:
a) Reedova névu
b) smíšeného dysplastického névu
c) lentigo maligna melanoma
d) spitzoidní

10. Atypická melanocytární léze nejistých biologických vlastností vyžaduje:
a) kontroly pacienta
b) reexcizi
c) přizpůsobení dalších klinických kroků jejímu vertikálnímu rozměru
d) klinicko-patologickou korelaci

Pozn. **Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity* kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi posílejte na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.**

Odpovědi na otázky kontrolního testu publikovaném v č. 2/2013:
Bučková H.: Psoriáza u dětí
Správné odpovědi: 1b, 2a, 3b, 4b, 5a, b, 6c, 7a, c, d, 8b, 9c, 10b, c, d