proLékaře.cz | 18.11.2026

DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ
KONTROLNÍ TEST

1. Při operacích na nehtovém aparátu:
a) využíváme turniket po dobu 20 minut
b) totální ablace nehtové ploténky je lékem volby u zarůstajících nehtů
c) provádíme longitudinální biopsie nehtové matrix
d) provádíme transverzální biopsie nehtového lůžka

2. Při bioptickém vyšetření nehtového aparátu provádíme:
a) horizontální biopsie zadního nehtového valu
b) longitudinální biopsie nehtového lůžka
c) průbojníkové biopsie nehtové matrix větší než 4 mm
d) longitudinální biopsie nehtové matrix

3. Vznik paronychií a zarůstávání nehtů vyvolává:
a) tacrolimus
b) lamivudin
c) everolimus
d) indinavir

4. V diagnostice subunguální exostózy napomáhá:
a) Loveho test
b) rentgenové vyšetření distální falangy
c) angiografie
d) Hutchinsonovo znamení

5. Mezi matrix redukující operace zarůstajících nehtů patří:
a) Emmertova operace
b) parciální ablace nehtové ploténky
c) plastika podle Bartletta
d) Hanekeho operace

6. Pro třetí stadium zarůstajících nehtů je typické:
a) zarudnutí a otok nehtového valu
b) hypertrofie nehtového valu
c) hnisavá sekrece
d) bolestivost nehtového aparátu

7. Pro glomus tumor platí:
a) intolerance tepla
b) paroxysmální bolestivost končetiny
c) bolestivost při palpaci
d) zhoršení bolesti přiložením turniketu proximálně od nádoru

8. Subunguální keratoakantom:
a) spontánně neregreduje
b) je častým nádorem nehtového aparátu
c) vyskytuje se nejčastěji u žen na palcích nohou
d) v léčbě využíváme operaci podle Zadika

9. Subunguální melanom:
a) l/4 případů je amelanotická
b) probatorní excize není doporučována
c) Hildrethovo znamení je pozitivní
d) v léčbě využíváme amputaci falangy nebo celého prstu

10. Myxoidní cysta:
a) je častým onemocněním nehtového aparátu prstů nohou
b) je lokalizovaná v nehtovém lůžku
c) obsahuje vazký sekret bohatý na hyaluronovou kyselinu
d) spontánně regreduje

Pozn. **Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity* kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi posílejte na adresu redakce (Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2) vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.**

Odpovědi na otázky kontrolního testu publikovaném v č. 3/2013:
Pock L.: Atypické melanocytární léze
Správné odpovědi: 1b, 2d, 3c, 4a, 5b, 6c, 7d, 8b, 9d, 10c.