proLékaře.cz | 13.11.2026

Kontrolní test

1. **Která diagnóza nepatří mezi chronické kopřivky?**
   a) urticaria cholinergica
   b) urticaria e frigore
   c) urticaria solaris
   d) urticaria pigmentosa

2. **Co hodnotíme při zjišťování UAS (Urticaria Activity Score)?**
   a) pomfy a angioedém
   b) pomfy a pruritus
   c) pomfy a nutnost užívání antihistaminik
   d) pruritus a angioedém

3. **Pacienti s akutní kopřivkou by měli:**
   a) především 3–4 týdny držet dietu s omezením pseudoalergenů
   b) užívat antibiotika k léčbě možných infekčních fokusů
   c) podstoupit základní onkoscreening (RTG plic, PSA atd.)
   d) být primárně léčeni nesedativními antihistaminiky, bez dalšího podrobnějšího vyšetřování

4. **Co nepatří do diferenciální diagnostiky u kopřivky?**
   a) Schnitzlerův syndrom
   b) urticaria vasculitis
   c) ACE – inhibitory indukovaný angioedém
   d) Gorlinův syndrom

5. **Co je standardní léčbou chronické kopřivky?**
   a) sedativní antihistaminika podávaná na noc
   b) bolus kortikosteroidů v první linii léčby
   c) nesedativní antihistaminika druhé generace v první linii léčby
   d) dieta s omezením pseudoalergenů

6. **Který preparát není podle nejnovějších doporučení vhodný k léčbě kopřivky?**
   a) H1 – antihistaminika
   b) kortikosteroidy
   c) dapson
   d) montelukast

7. **Která terapie je doporučována jako druhý krok u chronické kopřivky při selhání léčby první linie?**
   a) výměna H1 – antihistaminika
   b) přidání sedativního antihistaminika první generace na noc ke stávající terapii
   c) přidání montelukastu ke stávající terapii
   d) navýšení dávky H1 – antihistaminika druhé generace až na 4násobek základního dávkování

8. **Co nepatří do histologického obrazu kopřivky?**
   a) edém kória
   b) dilatace postkapilárních venul
   c) parakeratóza
   d) perivaskulární zánětlivý infiltrát

9. **Omalizumab je:**
   a) anti TNFα protilátka
   b) anti IgE protilátka
   c) lék první volby u hereditárního angioedému
   d) EGFR inhibitor

10. **Pro urticaria vasculitis platí, že:**
    a) patří mezi fyzikální kopřivky
    b) je vyvolána působením zvýšené teploty
    c) mohou být postiženy vnitřní orgány
    d) pomfy trvají 2–3 hodiny

Pozn. **Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi posílejte na e-mailovou adresu redakce: kozni@lf1.cuni.cz vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.**

Odpovědi na otázky kontrolního testu publikovaném v č. 1/2014:
Bienová, M.: Dermatoskopická diagnostika alopecií
Správné odpovědi: 1b, 2b, 3b, 4d, 5a, 6d, 7b, 8c, 9b, 10c.