proLékaře.cz | 10.11.2026

Psychofarmaka v dermatologii

1. Riziko návyku a vzniku lékové závislosti je vysoké při léčbě:
a) benzodiazepinovými anxiolytiky
b) selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu
c) fytofarmakem třezalkou tečkovanou
d) thymoprofylaktiky – stabilizátory nálady

2. Poruchou nálady při kožních onemocněních trpí přibližně:
a) 25 % pacientů
b) 10 % pacientů
c) 60 % pacientů
d) 5 % pacientů

3. Nejčastěji předepisovanými antidepresivy jsou:
a) tricyklická a tetracyklická
b) heterocyklická
c) inhibitory zpětného vychytávání dopaminu a noradrenalinu
d) selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu

4. Hydroxyzin (f. o. Atarax®) – piperazinové anxiolytikum:
a) vyvolává závislost a abstinenční syndrom
b) působí anti-H2-histaminově
c) aktivním metabolitem je antihistaminikum cetirizin
d) nezpůsobuje suchost sliznic

5. Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu nemají tyto kožní nežádoucí účinky:
a) petechie, ekchymózy, spontánní hematomy
b) leukocytoklastickou vaskulitidu
c) fototoxické a fotoalergické reakce
d) sonychodystrofii

6. Anxiolyticky nepůsobící farmaka s jiným hlavním léčebným účinkem jsou:
a) antidepresiva
b) betablokátory
c) antipsychotika
d) diuretika

7. Snížení serotoninu v trombocytech způsobují:
a) nootropika
b) selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu
c) antioxidanty
d) thymoprofylaktika

8. Atypická antipsychotika – druhá generace antipsychotických látek:
a) snižují sociální funkce
b) nezvyšují kvalitu života pacientů
c) nemají příznivý léčebný profil
d) jsou významně lépe snášena nemocnými

9. U pacientů vyššího věku a somaticky nemocných jsou nutné:
a) nižší dávky psychofarmak: 20–50 % obvyklých dávek ve středním věku
b) nehrozí nebezpečí rozvoje extrapyramidového syndromu
c) podávání benzodiazepinů neomezuje aktivitu seniorů
d) ve stáří je nižší senzitivita k neurotransmiterům

10. Deprese nebývá provázena:
a) endokrinními poruchami
b) strukturálními a funkčními odchylkami CNS
c) imunitními poruchami
d) nízkým rizikem rozvoje chronicity deprese a sebevražedného jednání

Pozn.: Správnými odpověďmi na otázky kontrolního testu získáte 2 kredity kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi posílejte na e-mailovou adresu: **kozni@lf1.cuni.cz**, vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu publikovaného v č. 2/2014:
Brodská P.: Kopřivka – klasifikace, diagnostika, léčba
Správné odpovědi: 1d, 2b, 3d, 4d, 5c, 6c, 7d, 8c, 9b, 10c