

## DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ

## KONTROLNÍ TEST

1. **Eozinofilní fasciitida je laboratorně typicky provázena nálezy kromě:**
  - a) zvýšené sedimentace krve
  - b) hypereozinofilie
  - c) hypergamaglobulinémií
  - d) leukocytózy
2. **Tuhá kůže u systémové sklerodermie, na rozdíl od generalizované morfeje, typicky:**
  - a) symetricky postihuje ruce
  - b) vynechává podkolenní a loketní jamky
  - c) vynechává hlavu a krk
  - d) vynechává areoly
3. **Rutinní vyšetření u závažných forem lokalizované sklerodermie s hlubokým postižením zahrnuje vše kromě:**
  - a) sedimentace krve
  - b) krevního obrazu
  - c) hladin kreatinkinázy
  - d) protilátka na borelie
4. **Oční vyšetření se u aktivní lokalizované sklerodermie u dětí doporučuje u:**
  - a) hluboké lokalizované sklerodermie
  - b) frontoparietální morfeje
  - c) generalizované morfeje
  - d) eozinofilní fasciitidy
5. **Pro aktivitu lokalizované sklerodermie nesvědčí:**
  - a) erytematózní lem indurovaného projevu
  - b) hnědošedá hyperpigmentace
  - c) přibývání nových projevů
  - d) rozšiřování již přítomných projevů
6. **Za neúčinnější fototerapii lokalizované sklerodermie je považována léčba:**
  - a) širokospektrým UVA
  - b) UVA-1
  - c) lokální PUVA
  - d) UVB
7. **Fototerapie je vhodná léčba:**
  - a) eozinofilní fasciitidy
  - b) lineární lokalizované sklerodermie
  - c) hluboké lokalizované sklerodermie
  - d) ložiskové morfeje „en plaque“
8. **Celkové kortikosteroidy v monoterapii jsou první volbou u:**
  - a) ložiskové morfeje
  - b) generalizované lokalizované sklerodermie
  - c) eozinofilní fasciitidy
  - d) lineární lokalizované sklerodermie
9. **U rychle progredující generalizované lokalizované sklerodermie s postižením podkoží je nevhodnější zahajovací celkovou léčbou:**
  - a) PUVA terapie
  - b) metotrexát
  - c) kortikosteroidy
  - d) kombinace metotrexátu a kortikosteroidů
10. **Mezi doporučované celkové léčby závažnějších forem lokalizované sklerodermie nepatří:**
  - a) D-penicilinamin
  - b) kortikosteroidy
  - c) metotrexát
  - d) mykofenolát mofetil

Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zaslány redakci jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi pošlete na **e-mailovou adresu kozni@lf1.cuni.cz** vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.

Odpovědi na otázky kontrolního testu v č. 5/2016

**Machovcová A.: Kontaktní dermatitidy – část II: epikutánní testy v současné praxi**

**Správné odpovědi: 1d, 2b, 3c, 4c, 5b, 6d, 7c, 8d, 9b, 10d.**