proLékaře.cz | 15.11.2026

Zápis ze schůze výboru ČDS
Praha 15. 11. 2018

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, doc. Kuklová, doc. Pánková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork, dr. Vocilková
Omluveni: prim. Drlík, dr. Polášková
Místo: Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, Praha
Čas: 10:00–12:00 hod.

PROGRAM

A. Projednáno
Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané 27. 9. 2018 – rozeslán e-mailem, připomínkován a schválen.

B. Nově projednáno:
1. Nový vzdělávací program – atestace z dermatovenerologie
Výbor informoval, že podle nového vzdělávacího programu bude školenec ze samostatného dětského kožního oddělení v kmeni napříště absolvovat 2 roky na „dospělé" dermatovenerologii. Další specializovaná příprava školence pak proběhne na mateřském pracovišti dětské dermatologie. Bude jednáno o možnosti výjimky pro školence na Dětské dermatologii v Brně, která je součástí Dětské kliniky FN Brno pro kmen v dětské dermatologii.

2. Školení o laserech
Vzdělávání v laserové terapii je součástí vzdělávacího programu korektivní dermatologie. Pro provozování konkrétních laserových výkonů na konkrétním přístroji pak postačuje zaškolení výrobcem.

3. Provádění mammaplastik
Na dotaz odborné veřejnosti výbor konstatuje, že výkony na této největší kožní žláze může provádět lékař, který je erudován v těchto dermatochirurgických výkonech.

4. Příprava kongresů 2019
V současné době jsou navrženy předběžné pozvánky a vyvěšeny na webu ČDS pro DermaUpdate 2019 (26. 2. 2019 v kongresovém centru Cubex v Praze 4, metro C Pankrác) a kongresu ČDS-SDVS (6.–8. 6. 2019 v hotelu Clarion v Olomouci). Připravují se programy obou akcí.

5. Minutová režie
Výbor ČDS se stále snaží tuto problematiku oživovat na MZ. MZ ČR neodpovídá.
Dr. Vocilková informuje o průběhu schůze Sdružení ambulantních specialistů. Je snahou upozornit, že prvotní nastavení minutové režie je záležitostí MZ a nikoli zdravotních pojišťoven a je tedy potřeba řešit na MZ.

6. Akreditace pracovišť pro dětskou dermatologii
Řadě pracovišť vypršela akreditace (např. FNKV Praha, VFN Praha, FNM Praha, FN Brno). Přitom nová Akreditační komise pro dětskou dermatologii nebyla MZ ČR dosud ustanovena. Aktualizovaný vzdělávací program pro dětskou dermatologii připraven, navrhla prim. Bučková.

7. Pražské onkologické kolokvium 2019
Prof. Petruželka žádá o poskytnutí záštity na Pražské onkologické kolokvium v lednu 2019 – výbor ČDS souhlasí.

8. Retardovaný penicilin
Retardované PNC t. č. nejsou hrazeny ze ZP: náklady jdou na vrub zdravotnického zařízení. Bude se i nadále požadovat řešení na MZ ČR.

9. Přesun výkonů L1 a L2 do kategorie L3 v odbornosti 404
Neprobíhá automaticky, musí se žádat individuálně na ZP. Není aktuální u zařízení, která nepřekračují své limity úhrad. ZP 211 má v dodatku smlouvy neúhradu zvláště nákladných pacientů – dr. Žampachová vyzývá k plošnému řešení. Výbor ČDS oslovil dopisem všechny pojišťovny, proběhla i osobní jednání předsedy ČDS. S ohledem na výše uvedené a po předchozích zkušenostech je výbor ČDS připraven poskytnout individuální podporu konkrétním pracovištím při jimi iniciovaných dohodovacích řízeních, popř. navrhuje, aby zdravotní zařízení předem pojišťovně avizovalo převzetí finančně náročného pojištěnce.

10. Informační leták o riziku NMSC při užívání hydrochlorothiazidu
Výbor ČDS obdržel informační leták a vyvěsil na webu ČDS v kolonce Aktuality.

11. Léková agenda (prim. Benáková)
Bereme na vědomí:
Imnovid (pomalidomid) – 4. HZ, SÚKL nevyhověl žádosti žadatele (Celgene) o trvalou úhradu v indikaci mnohočetný myelom;
Kevzara (sarilumab) – 2. HZ, indikací je RA, lék 3. linie (nedostatečná odpověď na DMARD a anti TNF);

proLékaře.cz | 15.11.2026

Ocrevus 1. HZ – okrelimuzab k léčbě roztroušné sklerózy (RRRS) SÚKL úhradu nepřiznal.
Bez připomínek:
Kyntheum (brodalumab) – 2. HZ
1. Léčba středně těžké až těžké psoriázy s PASI více než 10 u dospělých:
   – kde nelze použít dva z následujících způsobů konvenční systémové léčby: acitretin, metotrexát, cyklosporin, apremilast nebo fototerapii (PUVA či NBUVB) z důvodů nedostatečné účinnosti, intolerance či kontraindikace.
   Ukončení léčby brodalumabem nebo přímé převedení na další biologikum je indikováno v případě:
   – nedosažení hodnoty PASI 75 po úvodních 4 měsících léčby nebo
   – poklesu účinnosti zavedené léčby brodalumabem pod PASI 50 nebo při účinnosti v intervalu PASI 50-75, je-li současně hodnota DLQI větší nebo rovna 5.
2. Léčba středně těžké až těžké psoriázy s PASI více než 10 u dospělých pacientů, u kterých je zároveň splněno alespoň jedno z následujících kritérií:
   – nedošlo k dosažení hodnoty PASI 50 po 3, resp. 4 měsících (podle druhu přípravku) předchozí biologické léčby;
   – došlo k poklesu účinnosti zavedené biologické léčby pod PASI 50 nebo při účinnosti v intervalu PASI 50–75, je-li současně hodnota DLQI větší nebo rovna 5;
   – je kontraindikována jiná biologická léčba, nebo je předchozí biologická léčba ukončena z důvodu nežádoucích účinků.
   Ukončení léčby brodalumabem nebo přímé převedení na další biologikum je indikováno v případě:
   – nedosažení hodnoty PASI 50 po úvodních 4 měsících léčby nebo
   – poklesu účinnosti zavedené léčby brodalumabem pod PASI 50 nebo při účinnosti v intervalu PASI 50–75, je-li současně hodnota DLQI větší nebo rovna 5.

Cimzia (certolizumab pegol) – 2. HZ, žádost se týká rozšíření indikace RA na neléčené MTX, v indikaci je kromě AS, psoriáza. Léčba psoriázy u dospělých: indikační podmínky podobné jako u brodalumabu.

U všech indikací je možné při nedostatečné účinnosti či intoleranci této léčivé látky pacienta převést na léčbu jinou léčivou látkou z referenční skupiny č. 70/2 nebo na jinou biologickou léčbu (eventuálně JAK inhibitor). Připomínky:
Injexate – 1. HZ, inj. metotrexát 15 a 25 mg amp. – žadatel žádá o úhradu pro indikaci morbus Crohn, SÚKL vyhověl. Jinak je v indikačních kritériích uváděna RA a PsA – viz níže, limitace na odbornost L/REV, DER, GIT. **Potud bereme na vědomí.**
SÚKL
P: Léčba je hrazena v indikaci:
1. Těžká aktivní revmatoidní artritida při nedostatečném účinku maximální tolerované dávky perorální formy metotrexátu či intoleranci perorální formy metotrexátu. Dále je léčba hrazena v indikacích juvenilní idiopatická artritida a psoriatická artritida, je-li indikována léčba pomocí antirevmatik modifikujících průběh onemocnění (DMARD).
2. Mírná až středně závažná chronicky aktivní Crohnova nemoc, která projevovala aktivitu a symptomy po dobu nejméně 3 měsíců navzdory vysokým dávkám perorálních kortikosteroidů (ekvivalent prednisonu minimálně 20 mg/den). Léčba pokračuje a je hrazena u pacientů, kteří dosáhli remise. Odezva na léčbu se zhodnotí po prvních 16 týdnech léčby a poté je odezva hodnocena alespoň jednou za půl roku na běžné kontrole.
   V SPC všech inj MTX je ale uváděna i středně těžká až těžká psoriáza, což v indikacích SÚKLu zcela chybí; již jsme na tuto diskrepanci upozorňovali dříve. Nadále je uváděna z dermatologických indikací jen PsA, jedná se o znění z poslední revize v roce 2009.
   Inj. MTX není sice u samotné kožní psoriázy bez PsA tak často používán jako p. o. forma, ale pro určité případy (analogicky jako u RA – viz dále) je nezbytný. **Žádáme proto o doplnění této indikace do indikačních kritérií, jak odpovídá SPC i klinické praxi, se specifikací jako u RA, tj. středně těžká až těžká psoriáza při nedostatečném účinku maximální tolerované dávky perorální formy metotrexátu či intoleranci perorální formy metotrexátu.**
   Ostatní injekční MTX – NHZ **L04AX03: Injexate, Metoject, Metoject Pen, Nordimet** – stejná situace.
   To znamená, že uznání indikace morbus Crohn bereme na vědomí. Současně ale žádáme o doplnění psoriázy – viz výše.

12. Metodický pokyn pro venerologii (prof. Resl)
Prof. Resl informuje, že do připomínkového řízení na MZ podával po konzultacích již 13. verzi Metodického pokynu. Venerologická sekce je zvána k dohodovacím řízením. Nyní je Národní referenční laboratoř (NRL) provozována v rámci SZÚ.
Aktualizované znění projedná Venerologická sekce ČDS dne 15. 11. 2018. Výbor ČDS upozorňuje, že problematika byla již opakovaně probírána, že si za jejím zněním stojí a doporučuje ji přijmout v současném stavu.

13. Program odborných akcí na rok 2019
Nyní je přihlášeno 30 odborných akcí. Výbor ČDS projednal seznam, který bude vyvěšen na webu ČDS a eventuálně průběžně aktualizován.

14. Faktura za web
Výbor ČDS schválil proplacení faktury ve výši 8 820 Kč za vedení webu ČDS (www.derm.cz) v průběhu 3–10/2018.

15. Inventarizace majetku výboru ČDS
V současné době je evidován kávovar a kávová souprava.

16. Členský poplatek EADV a akce pro ILDS
(World Health Day)
Členský poplatek EADV musí být uhrazen do 31. 1. 2019.

proLékaře.cz | 15.11.2026

ILDS navrhuje připojit se ke „Světovému dni zdraví“ – termín určuje pro každou zemi národní odborná společnost.

17. Korejské sympozium, francouzské stipendium
Ve dnech 28.–31. 3. 2019 se v Soulu koná „KoreaDerma 2019“, který je pořádán jako mezinárodní sympozium estetické dermatologie spolu s Asociací korejských dermatologů. Francouzská dermatologická společnost (SDF) vypisuje 7 stipendií (od 4500 do 9000 €) na půlroční stáže na francouzských klinikách s termínem do 15. 5. 2019 (s podmínkou znalosti francouzštiny).

18. Termíny příštích schůzí výboru ČDS v roce 2019:
10. ledna, 7. března, 2. května, 3. června

19. Sekretářky výboru ČDS
Výbor ČDS schvaluje pro r. 2019 2 sekretářky – paní Čížková (fakturace CN Brown), paní Sitařová (Dohoda o pracovní činnosti).

20. Noví členové
dr. Záveská (Vrchlabí – Praha 2), dr. Preislerová (Plzeň – Kladno), dr. Šimková (Praha 2 – VFN), dr. Konášová (Praha 8 – Nemocnice Bulovka), dr. Hradecká (Vimperk – Kladno), dr. Dobiáš (Ostrava)
změny: dr. Vacková – Bartoňová (Šumperk)

21. Příští schůze výboru ČDS: 10. 1. 2019 v Praze

Zapsal: doc. Ettler

osobní zprávy

Doc. MUDr. Jaromír Kejda, CSc.
(10. 6. 1935 – 23. 11. 2018)

Na sklonku roku 2018 nás ve věku 83 let opustil pan docent MUDr. Jaromír Kejda, CSc.

Po doc. Nožičkové, prof. Novotném, prof. Vosmíkovi, prof. Malinovi a doc. Novákovi odchází další z generace našich učitelů.

Pocházel z Ostravy, odkud se po maturitě vydal studovat medicínu do Brna. Po promoci nastoupil na dermatovenerologickou kliniku nynější 3. LF UK v Praze. Za komunistické normalizace musel z kliniky odejít a vedl dermatologickou ambulanci v Thomayerově nemocnici a IKEMu.

Jeho odbornou láskou byla mykologie, které se s neutuchajícím zápalem věnoval a ve které vyškolil řadu kolegů. Byl autorem mnoha publikací, členem několika odborných společností.

Měla jsem to štěstí, že jako absolventka na interním kolečku v Thomayerově nemocnici jsem v Krči narazila na pana docenta. Bez váhání věnoval svůj čas a znalosti neznámé začátečnici. Jeho vstřícný a rozšafný přístup, komunikace a partnerský vztah k pacientovi, v té době u nás ve zdravotnictví cosi dost neobvyklého, mě ovlivnily na celý profesní život.

Všestrannost, odborný záběr na klinické úrovni, německý smysl pro řád věcí, noblesa, velkorysost, kolegialita, ale i smysl pro humor a láska k životu – to byly vlastnosti, kterými oplýval. Spojovalo nás nadšení pro dermatologii a vzájemný respekt.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte se mnou.

Nina Benáková

proLékaře.cz | 15.11.2026

Informace k přiložené kartičce s novou AJCC klasifikací pro melanom, verze 8

Doc. MUDr. M. Arenbergerová, PhD.
MUDr. M. Pásek
Dermatovenerologická klinika 3. LFUK a FNKV
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, e-mail: melanom@fnkv.cz

VÁŽENÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ,

v dnešním čísle časopisu Česko-Slovenská dermatologie se Vám do rukou dostává kartička s novou AJCC klasifikací pro melanom, verze 8, která vešla v platnost na začátku roku 2018.

Najdete v ní několik rozdílů oproti klasifikaci AJCC 7. Pro praxi dermatologa je asi nejzásadnější změnou fakt, že se Breslow již neuvádí na dvě desetinná místa, nýbrž se zaokrouhluje na jedno (např. 0,75 mm na 0.8 mm) a údaje o mitózách jsou pro novou klasifikaci irrelevantní.


Pro ty, co se zabývají léčbou pokročilého melanomu, stojí jistě za zmínku preciznější rozdělení III. a IV. stadia do 4 podskupin A-D, zapracované podle prognózy pacientů.

Nejzásadnější změny v managementu pacientů s novou klasifikací pouze souvisí. Vyšetření sentinelové uzliny (SLN) je doporučováno u tloušťky melanomů již od 0,8 mm s přihlédnutím k věku pacienta a přitěžujícím faktorům jako je ulcerace, regrese apod. Pozitivita SLN při hodnotě Breslow mezi 0,8 mm – 1,0 mm se pohybuje mezi 5 – 10 % a představuje tak relativně vysoké riziko. Pokud při hodnotě Breslow < 0,8 mm s ulcerací nebo Breslow 0,8 – 1,0 mm nezávisle na ulceraci, není indikováno vyšetření SLN, je nutné pacienta hodnotit dle klinického stagingu, naopak v případě indikace vyšetření SLN se hodnocení provádí dle patologického stagingu.

Změny na podkladě studie DeCOG a MSLT-II, které byly představeny na ASCO 2018, se týkají postupu po zjištění pozitivity SLN. Disekce spádových lymfatických uzlin neprodlužuje statisticky signifikantně přežití pacienta a tento zákrok se standardně neprovádí do velikosti metastázy v SLN do 1 mm. Při velikosti od 1 mm je výkon s pacientem individuálně diskutován. Pokud se nepřistoupí k disekci spádových uzlin při pozitivitě SLN je nutné sonograficky kontrolovat spádové uzliny v kratších časových odstupech (každé 3-4 měsíce po dobu prvních 2 let a poté 3.-5. rok dispenzarizace každých 6 měsíců – dle NCCN Guidelines Version 2.2019 Cutaneous Melanoma).

Přejeme Vám hodně úspěchů při práci s touto kartičkou, ať se Vám pohodlně nosí v kapse pláště a pro ty, kdo raději pracují s elektronickými médii, najdete tyto údaje na webovém rozhraní www.derm.cz nebo pomocí QR kódu uvedeném na této stránce.

Doc. MUDr. M. Arenbergerová, PhD.
MUDr. M. Pásek



proLékaře.cz | 15.11.2026

Odborné akce 2019

9. 4. 2019
Setkání dermatovenerologů kraje Vysočina
Místo konání: hotel Rytířsko u Jihlavy
Délka trvání: 3 hodiny
Pořadatel: Kožní oddělení Nemocnice Jihlava
Odborný garant: MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.
Kontakt: znevoralova@atlas.cz

11. 4. 2019
XI. konference Dermatologie pro praxi
Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc
Délka trvání: 8 hodin
Pořadatel: Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FNOL, Společnost SOLEN, s.r.o., a časopis Dermatologie pro praxi
Odborný garant: odb. as. MUDr. Martin Tichý, Ph.D.
Kontakt: tichy.martin.jun@fnol.cz

11. 4. 2019
13. Západočeský dermatologický seminář
Místo konání: FN Plzeň-Bory, pavilon č. 6 a pavilon č. 4
Délka trvání: 3 hodiny
Pořadatel: Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň
Odborný garant: prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.
Kontakt: kozniklinika@fnplzen.cz

12. 4. 2019
202091104 Kurz – Dětská dermatovenerologie nejen pro dermatology: infekční onemocnění včetně virových exantémů dětského věku
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
Délka trvání: 6 hodin
Pořadatel: Katedra dermatovenerologie IPVZ
Odborný garant: MUDr. Zuzana Plzáková, Ph.D.
Kontakt: www.ipvz.cz; tel. 261 092 443

25. 4. 2019
202091105 Kurz – Cesta k diagnóze: klinicko-patologické korelace případů z praxe
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
Délka trvání: 6 hodin
Pořadatel: Katedra dermatovenerologie IPVZ
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
Kontakt: www.ipvz.cz; tel. 261 092 443

26. 4. 2019
Krajská dermatovenerologická konference
Místo konání: Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice, o. z.
Délka trvání: 4 hodiny
Pořadatel: Kožní oddělení Krajské zdravotní, a. s., Masarykova nemocnice, o. z.
Odborný garant: prim. MUDr. Olga Filipovská
Kontakt: eduard.hrncir@kzcr.eu

23. 5. 2019
Odborný seminář Kožního oddělení FN Ostrava
Místo konání: posluchárna Domova sester FN Ostrava
Délka trvání: 3 hodiny
Pořadatel: Kožní oddělení FN Ostrava
Odborný garant: prim. MUDr. Yvetta Vantuchová, Ph.D.
Kontakt: jana.gletova@fno.cz

6.–8. 6. 2019
XV. kongres ČDS+SDVS
Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc
Délka trvání: 2 dny
Pořadatel: ČDS ČLS JEP, SDVS
Odborný garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
Kontakt: www.derm.cz

10.–15. 6. 2019
24th World Congress of Dermatology
Milano, Itálie
Kontakt: www.wcd2019milan.org

19. 6. 2019
Regionální setkání dermatovenerologů
Místo konání: Petrof, Hradec Králové
Délka trvání: 4 hodiny
Pořadatel: Klinika nemocí kožních a pohlavních, FN a LF UK v Hradci Králové
Odborný garant: doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.
Kontakt: miloslav.salavec@fnhk.cz

6. 9. 2019
Setkání dermatovenerologů kraje Vysočina
Místo konání: hotel Rytířsko u Jihlavy
Délka trvání: 5 hodin
Pořadatel: Kožní oddělení Nemocnice Jihlava
Odborný garant: MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.
Kontaktní osoba: znevoralova@atlas.cz

25. 9. 2019
Regionální setkání dermatovenerologů
Místo konání: Petrof, Hradec Králové
Délka trvání: 4 hodiny
Pořadatel: Klinika nemocí kožních a pohlavních, FN a LF UK v Hradci Králové
Odborný garant: doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.
Kontakt: miloslav.salavec@fnhk.cz

proLékaře.cz | 15.11.2026

galenoderm

galenoderm

EXCIPIAL®

Daylong™

INFECTOSCAB® 5 %

Kerasal®

Loceryl®

Actinica® Lotion

soolantra®

Differine

Cetaphil

Clobex®

ROZEX

Galenoderm s.r.o., Nobelova 28, 831 02 Bratislava 3, Slovenská republika
www.galenoderm.com

galenoderm

proLékaře.cz | 15.11.2026



Jak důležité je pro Adama PASI 100?

kyntheum®

Brodalumab

Čisté sebevědomí

Přípravek Kyntheum® je indikován k léčbě středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých pacientů, kteří jsou kandidáty pro systémovou léčbu.[1]

LEO®

Rychlý nástup účinku[2]

Vysoká míra zhojení[3]

Dlouhodobý účinek[3]

Zkrácená informace o léčivém přípravku

Název léčivého přípravku: Kyntheum® 210 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. **Složení:** předplněná injekční stříkačka obsahuje brodalumabum 210 mg v 1,5 ml roztoku. Jeden ml roztoku obsahuje brodalumabum 140 mg. **Léková forma:** injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. **Indikace:** léčba středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých pacientů, kteří jsou kandidáty pro systémovou léčbu. **Dávkování:** Doporučená dávka je 210 mg ve formě subkutánní injekce v týdnech 0, 1 a 2, následovaná dávkou 210 mg každé 2 týdny. **Kontraindikace:** hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku, aktivní Crohnova nemoc a klinicky významné aktivní infekce např. aktivní tuberkulóza. **Zvláštní upozornění:** byly hlášeny případy sebevražedných představ a chování, včetně dokonaných sebevražd. Většina pacientů, u kterých se objevilo sebevražedné chování, měla v anamnéze depresi a/nebo sebevražedné představy a chování. Přípravek může zvyšovat riziko infekcí, jestliže se plánuje použít přípravek u pacientů s chronickou infekcí nebo s opakovanou infekcí v anamnéze, je třeba postupovat opatrně. Doporučuje se, aby pacienti v souladu s místními imunizačními předpisy podstoupili všechna potřebná očkování ještě před zahájením léčby přípravkem. **Interakce:** současně s přípravkem se nesmí podávat živé vakcíny. **Fertilita, těhotenství a kojení:** ženy ve fertilním věku musí během léčby a po dobu nejméně 12 týdnů po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci. Údaje o podávání brodalumabu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Není známo, zda se brodalumab vylučuje do lidského mateřského mléka. **Nežádoucí účinky:** chřipka, dermatofytózy, neutropenie, bolest hlavy, orofaryngeální bolest, průjem, artralgie, únava. **Uchovávání:** Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Přípravek se smí uchovávat v krabičce a při pokojové teplotě (do 25 °C) maximálně po dobu 14 dnů, a to pouze jednou. Jakmile se přípravek vyjme z chladničky a nechá se ohřát na pokojovou teplotu (do 25 °C), musí se použít do 14 dní nebo zlikvidovat. **Držitel rozhodnutí o registraci:** LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Dánsko. **Registrační číslo:** EU/1/16/1155/001. **Způsob výdeje a hrazení:** výdej je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. **Datum revize textu:** 09/2017. **Před předepsáním léčivého přípravku si přečtěte plnou verzi souhrnu údajů o přípravku. Reklama na léčivý přípravek.**

MAT-18116

Reference: 1. Kyntheum® (brodalumab) Summary of Product Characteristics, July 2017. **2.** Blauvelt A, et al. Rapid onset of action in patients with moderate-to-severe psoriasis treated with brodalumab: A pooled analysis of data from two phase 3 randomized clinical trials (AMAGINE-2 and AMAGINE-3). **3.** Lebwohl M, et al. N Engl J Med 2015;373:1318 –28.

LEO®

LEO Pharma s.r.o., Hanusova 18/1411, 140 00 Praha 4