proLékaře.cz | 13.11.2026

KONTROLNÍ TEST

1. Aktinická keratóza představuje prekancerózu pro:
a) bazocelulární karcinom kůže
b) maligní melanom
c) dermatofibrosarkoma protuberans
d) dlaždicobuněčný karcinom kůže

2. Mezi hlavní rizikové faktory pro vznik aktinických keratóz a dlaždicobuněčného carcinoma in situ patří:
a) chronická expozice UV záření, vyšší věk, nižší fototyp, imunosuprese
b) vyšší fototyp, mladší věk, fotoprotekce
c) hepatitida B a C
d) nadměrná konzumace alkoholu

3. Nejvyšší riziko transformace aktinické keratózy do invazivního cSCC vykazují:
a) aktinické keratózy s atypickými keratinocyty uloženými v bazální a suprabazální vrstvě
b) atrofické aktinické keratózy
c) pigmentované aktinické keratózy
d) lichenoidní aktinické keratózy

4. Pravidelné, každodenní užívání „sunscreenů" snižuje riziko vzniku invazivního cSCC až o:
a) 10 %
b) 20 %
c) 40 %
d) v klinických studiích se neprokázalo snížení rizika vzniku invazivního cSCC při pravidelném, každodenním užívání „sunscreenů"

5. Morbus Bowen vzniká nejčastěji:
a) ve kštici
b) v místech, která nejsou exponována UV záření
c) v solární lokalizaci, zejména na hlavě, krku a dorzech rukou
d) na ploskách a dlaních

6. Morbus Bowen je nejčastěji zaměněn za:
a) ložisko psoriázy nebo chronického ekzému
b) granuloma annulare
c) diskoidní lupus erythematodes
d) tinea corporis

7. Bowenoidní papulóza je asociována s infekcí:
a) molluscum contagiosum
b) herpes simplex
c) HIV
d) HPV 16 a 18

8. Diferencovaný typ PeIN může vzniknout v terénu:
a) lichen sclerosus et atrophicus – balanitis xerotica obliterans
b) morbus Bechcet
c) infekce HPV 16 a 18
d) ulcus durum

9. Pro systémovou chemoprevenci aktinické keratózy a dlaždicobuněčného carcinoma in situ lze použít:
a) nikotinamid, acitretin
b) cyklosporin A
c) metotrexát
d) vitamin D3

10. Ze současných možností lokální terapie aktinické keratózy je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a zároveň je dostupný na území ČR:
a) 5% imiquimod (Aldara)
b) 5-fluorouracil (Efudex)
c) 3% diklofenak sodný (Solaraze)
d) ingenol mebutát (Picato)

Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu.

Odpovědi posílejte na e-mailovou adresu: **kozni@lf1.cuni.cz** vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla a společně s odpověďmi uveďte svoje **evidenční číslo ČLK (ČLK ID).**

Odpovědi na otázky kontrolního testu v č.4/2021: Plzáková Z.: **Vývoj kůže a její bariérová funkce**

Správné odpovědi**: 1a,c, 2a,b,c,d, 3a,c, 4d, 5a,d, 6a, 7a,b, 8a,b,c,d, 9b,c, 10a,b.**