proLékaře.cz | 11.11.2026

KONTROLNÍ TEST

1. Systémová léčba AD je indikovaná v případě:
a) neúčinné intenzivní lokální protizánětlivé léčby
b) výrazně snížené kvality života
c) postižení viditelných/citlivých partií
d) vše z uvedeného

2. K systémové léčbě AD lze použít:
a) cyklosporin A
b) metotrexát
c) azathioprin
d) vše z uvedeného

3. Iniciálním léčebným cílem (po 3–4 měsících léčby) u systémové/biologické/cílené léčby AD je:
a) dosažení EASI 75
b) pokles DLQI o 7 bodů
c) snížení NRS alespoň o 4 body
d) nic z uvedeného

4. Minimální aktivita onemocnění je definovaná při:
a) dosažení IGA 1/2
b) dosažení EASI 75
c) BSA 5 %
d) DLQI 0/1

5. Cyklosporin:
a) je schváleným systémovým („on-label“) lékem AD od 16 let
b) počáteční dávka cyklosporinu je 2,5–3 mg/kg/den
c) maximální kontinuální doba podávání cyklosporinu je 2 roky
d) vše z uvedeného

6. Metotrexát:
a) maximální dávka MTX v refrakterních případech je 20 mg/týdně
b) MTX se užívá s jídlem
c) během léčby MTX se musí monitorovat renální funkce a krevní tlak
d) početí (u mužů i žen) je během léčby a následných 6 měsíců po ukončení léčby kontraindikované

7. Azathioprin:
a) má rychlý nástup účinku, maximální účinnost je dosažená za 4 týdny
b) počáteční dávka u dospělých je 2 mg/kg/den
c) před zahájením léčby se musí vyšetřit aktivita enzymu thiopurin metyltransferázy (TPMT)
d) azathioprin je kontraindikovaný v těhotenství

8. Dupilumab:
a) je indikovaný k léčbě středně závažné a závažné AD od 6 let věku
b) nejčastějším nežádoucím účinkem dupilumabu je konjunktivitida
c) pravidelný laboratorní monitoring dupilumabu není nutný
d) vše z uvedeného

9. JAK inhibitory:
a) mají imunosupresivní, protizánětlivé a antiproliferativní účinky
b) k léčbě středně závažné a těžké AD jsou registrované abrocitinib, baricitinib, upadacitinib
c) před léčbou a během léčby je nutné pravidelně provádět laboratorní kontroly a vylučovat aktivní infekce
d) vše z uvedeného

10. Za rizikového pacienta pro léčbu JAK inhibitory je nutné považovat:
a) pacienta staršího 60 let
b) pacienta s revmatoidní artritidou
c) pacienta s anamnézou hluboké žilní trombózy a plicní embolie
d) nic z uvedeného

Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu.
Odpovědi posílejte na e-mailovou adresu: **kozni@lf1.cuni.cz** vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla a společně s odpověďmi uveďte svoje **evidenční číslo ČLK, SLK (ID).**

Odpovědi na otázky kontrolního testu v č.2/2023: Machovcová A: **Atopická dermatitida: současná doporučení pro diagnostiku a léčbu. Část I.**
Správné odpovědi: 1a, 2a, 3c, 4d, 5a, 6a, 7c, 8d, 9b, 10b.