proLékaře.cz | 29.11.2026

TEST Z EPIDEMIOLOGIE

1. Pasivní imunita vzniká
a) po očkování živou nebo inaktivovanou vakcínou
b) podáním hotových protilátek ve formě hyperimunních zvířecích sér nebo lidského imunoglobulinu
c) po prožitém onemocnění
d) transplacentárním přestupem mateřských protilátek na novorozence

2. K přímému přenosu infekce dochází při
a) poškrábání či pokousání zvířetem
b) kontaktu s kontaminovanými předměty
c) poranění injekčními stříkačkami a jehlami
d) doteku, sexuálním styku, kontaktem s výměty infikované osoby nebo zvířete

3. Ochrana proti virové hepatitidě A po očkování vzniká
a) ihned po očkování první dávkou vakcíny
b) do 7 dnů po naočkování první dávkou vakcíny
c) za 14–30 dnů po naočkování první dávkou vakcíny
d) za 14–30 dnů po naočkování druhou dávkou vakcíny

4. Nejčastějším původcem průjmových onemocnění u cestovatelů do zahraničí jsou
a) *Salmonely*
b) *E. coli*
c) *Rotaviry*
d) *Lamblia intestinalis*

5. Mezi transmisivní nákazy patří
a) malárie
b) nákazy vyvolané Echoviry
c) horečka dengue
d) echinokokóza

Správné odpovědi:
1. b, d; 2. a, d; 3. c, 4. b; 5. a, c.