

## 2 Klasifikácia diabetes mellitus a diferenciálna diagnostika

Emil Martinka

### 2.1 Klasifikácia diabetes mellitus

Diabetes mellitus (DM) je heterogénne ochorenie s účasťou rôznych patofyziologických mechanizmov, ktoré sa uplatňujú na úrovni viacerých orgánov. Pre klasifikáciu DM sa aktuálne aj naďalej používa etiologická klasifikácia ADA (American Diabetes Association) z roku 1998, ktorá ochorenie rozdeľuje do 4 základných typov, a to podľa etiológie a charakteru ochorenia (tab. 2.1):

- diabetes mellitus 1. typu (DM1T)
- diabetes mellitus 2. typu (DM2T)
- špecifické typy diabetes mellitus (SDM)
- gestačný diabetes mellitus (GDM)

Etiologická klasifikácia (tab. 2.2) má viacero klinických výhod. Presné zaradenie pacienta je však mnohokrát sťažené neistotou vyplývajúcou z heterogenity ochorenia a skutočnosti, že rôzne patogénne príčiny sa môžu u rovnakého pacienta vyskytovať súčasne. Tab. 2.3, s. 18, zobrazuje hlavné klinické a laboratórne znaky charakteristické pre DM1T, resp. DM2T, resp. SDM.

### 2.2 Diferenciálna diagnostika

V bežnej klinickej praxi je často náročné odlišiť dva najčastejšie sa vyskytujúce typy diabetu, a to DM1T, ktorý je vo väčšine prípadov podmienený autoimunitnou in-

zulitídou s deštrukciou B-buniek a následným deficitom inzulínu, od DM2T, čo je veľmi heterogénne ochorenie s rôznym vzájomným pomerom zníženej citlivosti na inzulín a funkčnej poruchy sekrécie inzulínu s relatívnym nedostatkom, ale aj neskorším úbytkom inzulínu v absolútnom množstve v priebehu vývoja ochorenia. U niektorých pacientov sa jednotlivé klinické prejavy vrátane laboratórnych znakov prekrývajú a nemožno vylúčiť, že u takéhoto pacienta sa môže súčasne, paralelne alebo následne, uplatňovať kombinácia viacerých patofyziologických mechanizmov a ich klinických a laboratórnych prejavov, ktoré sú charakteristické tak pre DM1T ako aj DM2T.

### 2.3 Diabetes mellitus – 1. typu versus 2. typu

V klinickej praxi sa iniciálna klasifikácia diabetu obvykle zakladá na použití klinických charakteristík (tab. 2.3) a je často subjektívna. Nesprávna klasifikácia môže viesť k omylom pri výbere zvolenej liečby, napríklad nevhodné použitie perorálnych antidiabetík (PAD) u pacientov s DM1T a tiež k nevhodnému vedeniu pacienta. Podľa literárnych údajov 7–15 % pacientov (s veľkou regionálnou variabilitou), ktorí sú iniciálne klasifikovaní a vedení ako pacienti s DM2T, má prítomné sérologické markery autoimunitnej inzulitídy a môže u nich ísť o DM1T vyžadujú-

Tab. 2.1 | Klasifikácia diabetes mellitus zahŕňa 4 klinické triedy (typy) a rizikový prediabetický syndróm

| TYP DIABETU                    | PODTPY  | MKCH       | DIAGNOSTIKA   |
|--------------------------------|---|------------|---|
| DM1T                           | klasická rýchle nastupujúca forma               | E10        | pre potvrdenie diagnózy je potrebné vyšetriť hladinu C-peptidu a podľa dostupnosti aspoň 1 z protilátok GADA a/alebo IA2-A          |
|                                | latentná forma (LADA)                           |            |   |
| DM2T                           |   | E11        | pre potvrdenie diagnózy je potrebné vyšetriť C-peptid.<br><b>Klasifikácia E11 zostáva aj po prechode na liečbu inzulínom</b>        |
| SDM                            | diabetes pri ochorení iných orgánových systémov | E12<br>E13 | pre potvrdenie diagnózy potrebné vylúčiť DM1T a DM2T<br>časť SDM sú dedičné formy diabetu – na ich potvrdenie potrebná analýza DNA* |
|                                | MODY  | E14        |   |
| GDM                            |   | O24        | diabetes v ťarchavosti  |
|                                |   | O24.0      | predtým existujúci DM1T   |
|                                |   | O24.1      | predtým existujúci DM2T   |
|                                |   | O24.3      | GDM vzniknutý v ťarchavosti   |
| RIZIKOVÝ PREDIABETICKÝ SYNDRÓM | IFG   | R73        | glykémia nalačno  |
|                                | IGT   |            | 75g OGTT  |
|                                | MS  |            | HbA <sub>1c</sub>   |

DM – diabetes mellitus DM1T – diabetes mellitus 1. typu DM2T – diabetes mellitus 2. typu GADA – protilátky proti dekarboxyláze/Glutamic Acid Decarboxylase Antibodies IA2A – protilátky proti tyrozínovým fosfatázam GDM – gestačný diabetes mellitus/diabetes v ťarchavosti IFG – hyperglykémia nalačno/Impaired Fasting Glucose IGT – porucha tolerancie glukózy/Impaired Glucose Tolerance LADA – neskorý autoimunitný diabetes mellitus dospelých/Latent Autoimmune Diabetes of Adults MKCH – medzinárodná klasifikácia chorôb MODY – Maturity-Onset Diabetes of the Young MS – metabolický syndróm SDM – špecifické (iné) typy diabetes mellitus

\*Analýzu DNA indikuje diabetológ (alebo detský endokrinológ a diabetológ pri negativite autoprotilátok GADA, IA2A, neprítomnosti metabolického syndrómu, pri neprítomnosti inej príčiny diabetu a splnení jednej z nasledujúcich podmienok: 1. začiatok diabetu v prvých 6 mesiacoch života alebo 2. vek diagnózy do 30 rokov a opakovaná stabilná hyperglykémia nalačno pri HbA<sub>1c</sub> do 7,5 % (DCCT) alebo 3. vek diagnózy do 30 rokov a merateľný C-peptid 3 roky po zistení diabetu alebo 4. vek začiatku do 40 rokov a obličkové cysty alebo porucha sluchu alebo atrofia optického nervu. Analýza DNA sa robí 1-krát počas života. Gén (gény), ktoré sa budú analyzovať určí podľa vyššie uvedených podmienok pracovník špecializovaného pracoviska na DNA-diagnostiku monogénových foriem diabetu.

júci odlišný terapeutický prístup. Hoci ani u pacientov so začiatkom diabetu v dospelom veku nemožno vylúčiť „klasickú formu“ DM1T s rýchlou deštrukciou B-buniek, vo väčšine prípadov je úbytok sekrécie inzulínu pozvolnejší a liečba inzulínom počas prvých mesiacov až rokov nie je nutná. Takýto priebeh DM1T sa označuje ako latentný autoimunitný DM dospelých (LADA) s menej agresívnou formou inzulinídy a pomalšie sa rozvíjajúcim deficitom inzulínu. S DM1T typu LADA sa najčastejšie stretávame u pacienta s diagnózou DM vo veku > 30 rokov, u ktorého liečba inzulínom nie je nutná minimálne počas nasledovných 6 mesiacov od diagnózy. Kritériá pre definíciu LADA sú však predmetom dlhodobých diskusií, rovnako ako aj otázka, či LADA predstavuje iba subtyp DM1T, alebo samostatnú, odlišnú klinickú jednotku. V porovnaní s klasickou formou DM1T majú pacienti s LADA vyššiu hmotnosť a majú prítomné

aj iné prejavy metabolického syndrómu. Poukazuje sa tiež na heterogenitu týchto pacientov a viacerí autori ich rozdeľujú do dvoch skupín s odlišnými klinickými, autoimunitnými aj genetickými črtami, a to podľa titra autoprotílátok. Pacienti s vysokými titrami alebo pozitívou viacerých autoprotílátok sa vo väčšine črt podobajú pacientom s DM1T, kým pacienti s nízkymi titrami a pozitívou iba jednej autoprotílátky sa podobajú (aj z hľadiska progresie úbytku sekrécie inzulínu) skôr pacientom s DM2T. Pri diferenciálnej diagnostike je okrem klinického obrazu a priebehu najdôležitejším parametrom hladina C-peptidu (marker vlastnej sekrécie inzulínu) a jeho následná dynamika. Pri nejednoznačných hodnotách C-peptidu (dolná tretina normálneho rozmedzia v čase diagnózy) sa doplní vyšetrenie dostupných markerov autoimunitnej inzulinídy, ako sú autoprotílátky pri dekarboxyláze kyseliny glutámovej (glutamic

**Tab. 2.2 | Etiologická klasifikácia diabetes mellitus**

| TYP DIABETU                                  | ETIOLÓGIA                                   | TYP DIABETU | ETIOLÓGIA   |
|--|---|-------------|---|
| <b>diabetes mellitus 1. typu</b>             |   |             | <b>Liekmi alebo chemicky indukovaný DM</b>          |
|  | autoimunitne podmienený                     |             | vacor   |
|  | idiopatický                                 |             | pentamidín  |
| <b>diabetes mellitus 2. typu</b>             |   |             | kyselina nikotínová                                 |
| <b>iné špecifické typy diabetes mellitus</b> |   |             | glukokortikoid                                      |
|  | <b>genetické defekty B-buniek</b>           |             | hormóny štítnej žľazy                               |
|  | chromozóm 12, HNF-1a(MODY3)                 |             | diazoxid  |
|  | chromozóm 7, glukokináza (MODY2)            |             | agonisti beta-adrenergných receptorov               |
|  | chromozóm 20, HNF-4a(MODY1)                 |             | tiazidy   |
|  | mitochondriálna DNA                         |             | dilantin  |
|  | iné   |             | interferon-a  |
|  | <b>genetická porucha účinku inzulínu</b>    |             | iné   |
|  | A typ inzulinovej rezistencie               |             | <b>infekcie</b>                                     |
|  | Lepreuchaunizmus                            |             | kongenitálna rubeola                                |
|  | Rabson-Mendenhallov syndróm                 |             | cytomegalovírus                                     |
|  | lipotrofický diabetes                       |             | iné   |
|  | iné   |             | <b>zriedkavé formy autoimunitne podmieneného DM</b> |
|  | <b>ochorenia exokrínnej časti pankreasu</b> |             | stiff-man syndróm                                   |
|  | pankreatitída                               |             | protílátky proti receptoru pre inzulín              |
|  | trauma-pankreatektómia                      |             | iné   |
|  | neoplázia                                   |             | <b>iné genetické syndrómy s výskytom DM</b>         |
|  | cystická fibróza                            |             | Downov syndróm                                      |
|  | hemochromatóza                              |             | Klinefelterov syndróm                               |
|  | fibrokalkulózná pankreatopatia              |             | Turnerov syndróm                                    |
|  | <b>endokrinopatia</b>                       |             | Wolframov syndróm                                   |
|  | akromegália                                 |             | Friedreichsova ataxia                               |
|  | Cushingov syndróm                           |             | Huntingtonova chorea                                |
|  | glukagonóm                                  |             | Lawrencov-Moonov-Beidelov syndróm                   |
|  | feochromocytóm                              |             | myotonická dystrofia                                |
|  | hypertyreóza                                |             | porfýria  |
|  | somatostatínóm                              |             | Praderov-Williho syndróm                            |
|  | aldosteronóm                                |             | iné   |
|  | iné   |             | <b>gestačný diabetes mellitus</b>                   |

acid decarboxylase antibodies – GADA), proti tyrozinovej fosfatáze (Tyrosine Phosphatase Antibodies – IA2A) a proti inzulínu (Insulin Antibodies – IAA). Okrem typických náleзов charakteristických pre DM1T alebo DM2T sa stretávame aj s rôznymi kombináciami nálezov, čo v úvode ochorenia umožňuje iba pracovnú diagnózu, ktorá sa neskôr upraví. Vysoké titre autoprotílátok a nízke hladiny C-peptidu pri relatívne krátkom trvaní diabetu nasvedčujú pre DM1T, resp. jeho menej agresívnu formu LADA. Diagnózu podporuje prítomnosť aj iných autoimunitných ochorení, najčastejšie autoimunitná tyreopatia, celiakia či vitiligo.

Takíto pacienti majú tiež vyššie hodnoty HDL-cholesterolu (HDL-C) a nižšie hodnoty triglyceridov, nižší BMI a potrebu nižších dávok inzulínu. Pokiaľ bol pacient vedený ako pacient s DM2T, je takýto nález dôvodom na preklasifikovanie na DM1T a úpravu liečby. Vysoké pozitívne titre GADA, ako aj dvojkombinácia GADA a IA2A sa u pacientov s nízkou hladinou C-peptidu združujú aj so skoršou potrebou substitúcie inzulínom. Naopak, znakmi zdôrazňujúcimi dominanciu me-

**Tab. 2.3 | Klinické a laboratórne znaky pre diferenciáciu typu diabetes mellitus**

| DIAGNOSTIKA       | DIFERENCIAČNÉ ZNAKY   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|
|                   | TYP DM  |   |   |   |
|                   | DM1T  | DM2T  | SDM<br>(špecifický typ diabetu)   |   |
| anamnéza          | vek obvykle < 35 rokov<br>(vyšší vek však DM1T nevylučuje)  | vek obvykle > 45 rokov  |   |   |
|                   | prítomnosť klasických príznakov hyperglykémie   | obvykle bez príznakov<br><i>alebo</i><br>len mierne klinické prejavy hyperglykémie  |   |   |
|                   | relatívne rýchlo nastupujúci klinický obraz<br>pokles hmotnosti v období diagnózy   |   |   |   |
|                   | v anamnéze predchorobia:<br>▪ viróza<br>▪ stres<br>▪ chirurgický zákrok a pod   | veľmi často:<br>▪ arteriálna hypertenzia<br>▪ dyslipidémia<br>▪ KVO<br>▪ sedavý spôsob života<br>▪ nesprávna životospráva | v anamnéze iné základné/sprievodné ochorenie:<br>▪ pankreasu<br>▪ pečene<br>▪ endokrinopatia<br>▪ užívanie niektorých liekov (kortikoidy)<br>▪ genetické syndrómy<br>▪ stav po transplantácii |   |
|                   | často sú prítomné aj iné autoimunitné ochorenia:<br>▪ štítnej žľazy<br>▪ nadobličiek<br>▪ celiakia<br>▪ vitiligo                        | často už prítomné komplikácie diabetu   | pri geneticky podmienených špecifických formách DM veľmi častý výskyt DM v rodinnej anamnéze<br>prejavy základného ochorenia  |   |
| klinický obraz    | klasické príznaky DM:<br>▪ polyúria<br>▪ polydipsia<br>▪ chudnutie<br>▪ perigenitálne zápal<br>▪ poruchy zrakovosti<br>▪ únava, slabosť | nadhmotnosť/obezita<br>klasické príznaky DM nemusia byť plne rozvinuté<br>niekedy príznaky už rozvinutých komplikácií     | rôzny (závislý od základnej príčiny)  |   |
|                   | laboratórne znaky   | nízke až nemeateľé hladiny C-peptidu obvykle vyššie hladiny HDL-C a nižšie hladiny TG v porovnaní s DM2T                  | normálne, resp. vysoké hladiny C-peptidu<br>hyperlipoproteinémia<br>dyslipidémia<br>obvykle nižšie hladiny HDL-C, vyššie hladiny TG v porovnaní s DM1T  | rôzne, obvykle normálne<br><i>alebo</i><br>mierne znížené hodnoty C-peptidu |
|                   |   | markery AI (autoprotílátky)   | pozitívne u väčšiny pacientov   | negatívne   |
| genetické markery | pozitívne predispozičné HLA-alely:<br>HLA DRB1*040x, *030x,<br>HLA DQB1*0302, *0201   | rôznorodé nálezy  | charakteristický (definovaný) genetický defekt  |   |
| iné znaky         | potreba nižších dávok INZ<br>vačšia variabilita glykémii<br>častejší výskyt hypoglykémii  | potreba vyšších dávok INZ   | prejavy základného ochorenia  |   |

AI – autoimunitná inzulinítida DM1T – diabetes mellitus 1. typu HDL-C – HDL-cholesterol INZ – inzulín KVO – kardiovaskulárne ochorenie SDM – špecifické (iné) typy diabetes mellitus TG – triglyceridy

chanizmov typických pre DM2T (inzulínová rezistencia) je vyššia hodnota BMI, obvodu pása, normálna hodnota C-peptidu, nízka hodnota HDL-C, vyššie hladiny triglyceridov, vyšší krvný tlak, častejší výskyt kardiovaskulárnych ochorení, nealkoholovej tukovej choroby pečene (NAFLD), hyperurikémie a neprítomnosť autoprotilátok GADA, IA2A.

Predmetom diferenciálne diagnostickej neistoty bývajú:

- **Jednoznačná pozitivita autoprotilátok u pacientov s normálnou hodnotou C-peptidu**, napriek dlhšiemu trvaníu ochorenia. Takýto nález môže poukazovať:
  - že autoimunitná inzulitída (typická pre DM1T) manifestovaná protilátkovou odpoveďou nemusí mať vždy korelát v deštruktívnej inzulitíde
  - že môže poukazovať na včasné štádium autoimunitného procesu (inzulitídy), ktorý ešte nedosiahol príslušnú mieru deštrukcie
  - že autoimunitná inzulitída (typická pre DM1T) ako aj prejavy charakteristické pre DM2T (inzulínová rezistencia a iné prejavy metabolického syndrómu) sa môžu u konkrétneho pacienta vyskytovať súbežne, v rôznej miere vyjadrenia. V prítomnosti inzulínovej rezistencie sa ako klinicky významný uplatní aj menší rozsah deštrukcie B-buniek
  - že predošlý priebeh a znaky ochorenia typické pre DM2T nevyučujú možnosť neskoršieho pridania sa aj autoimunitnej inzulitídy (s rôzne vyjadrenou agresivitou), s následným rizikom úbytku vlastnej sekrécie inzulínu v budúcnosti a potreby substitučnej liečby inzulínom
  - že v prípade autoprotilátok GADA môže ísť o pozitivitu GADA aj v dôsledku iného ochorenia, napr. pri zriedkavej autoimunitne podmienenej neurologickej poruche „stiff-person syndróm“ (syndróm stuhnutej osoby). Dekarboxyláza kyseliny glutámovej (GAD) sa totiž okrem buniek pankreatických ostrovčiek nachádza najmä v centrálnom a periférnom nervovom systéme. Je zodpovedná za katalyzáciu alfa-dekarboxykázy kyseliny L-glutámovej na kyselinu gama-amino butárovú, ktorá pôsobí ako inhibičný neurotransmitter v mozgu a podieľa sa na uvoľňovaní inzulínu zo sekrečných granúl. Existuje v 2 izoformách so 71 % homológiou sekvencie aminokyselín, s molekulovou hmotnosťou 65 a 67 kDa. Pacienti s DM1T majú na rozdiel od pacientov so stiff person syndrómom autoprotilátky proti GAD65 (zriedkavo GAD67). Okrem toho pri stiff-person syndróme sú titre protilátok veľmi vysoké.

- **Hraničná pozitivita GADA s normálnou hodnotou C-peptidu.** V prípade positivity GADA s hraničnými (1–2 IU/ml) titrami ide skôr o spornú (laboratórnu) pozitivitu. Budúcnosti však môže prejsť aj do jednoznačnej positivity.

- **Nízke hladiny C-peptidu bez prítomnosti autoprotilátok**

Okrem idiopatického DM1T, ktorý nemá autoimunitný podklad a konečných štádií deštrukcie B-buniek u pacientov s DM1T s vymiznutým C-peptidom, keď dochádza k postupnému vytrácaniu sa autoprotilátok sa s takýmto nálezom môžeme stretnúť aj u pacientov s predtým vedených ako DM2T:

- Ak ide o pacienta s dlhším trvaním DM (> 15–20 rokov), najpravdepodobnejšie pôjde o dôsledok vyčerpania B-buniek. Hladiny C-peptidu sú však v takomto prípade stále merateľné a obvykle sa pohybujú okolo dolnej hranice normy. Pacient by mal byť liečený aj inzulínom.
- Ak ide o pacienta s kratším trvaním DM (< 5 rokov), nízka hladina C-peptidu poukazuje na DM1T, resp. LADA, a to aj napriek neprítomnosti autoprotilátok. Autoprotilátky GADA sú prítomné u približne 65–85% pacientov s DM1T, resp. LADA, autoprotilátky IA2A u približne 45–75 % DM1T a autoprotilátky IAA u 30–85 % pacientov s DM1T.

## 2.4 Diagnostika špecifických geneticky podmienených typov diabetu

Analýzu DNA s cieľom diagnostiky špecifických geneticky podmienených typov diabetu indikuje diabetológ (alebo detský endokrinológ a diabetológ) pri negativite autoprotilátok GADA, IA2A, neprítomnosti metabolického syndrómu, pri neprítomnosti inej príčiny diabetu a splnení jednej z nasledujúcich podmienok:

- začiatok diabetu v prvých 6 mesiacoch života, alebo
- vek diagnózy < 30 rokov a opakovaná stabilná hyperglykémia nalačno pri  $HbA_{1c} \leq 7,5\%$  (podľa štandardu Diabetes Control and Complications Trial – DCCT), alebo
- vek diagnózy < 30 rokov a merateľný C-peptid 3 roky po zistení diabetu, alebo
- vek začiatku DM < 40 rokov a obličkové cysty alebo porucha sluchu alebo atrofia optického nervu

Analýza DNA sa robí 1-krát počas života. Gén (gény), ktoré sa budú analyzovať, určí podľa vyššie uvedených podmienok pracovník špecializovaného pracoviska na diagnostiku DNA-monogénových foriem diabetu (podrobnejšie viď [kap. 8](#), s. 83n).