

Manažment diabetikov s končatinovocievou artériovou chorobou

Peter Gavorník¹, Andrej Dukát^{1,2}, Ľudovít Gašpar^{1,3}, Gabriela Gubo¹, Naďa Bežillová^{1,4}, Martina Kováčová⁵, Eva Gavorníková^{1,6}, Anna Petrášová⁷, Iveta Gašparová^{1,8}, Lujza Sabolová^{9,10}, Marek Kučera^{3,11}, Katarína Kušendová¹², Alena Uhrinová^{1,3}, Matej Bendžala^{1,13}, Dáša Mesárošová^{3,10}

¹Angiologická sekcia Slovenskej lekárskej komory (AS SLK), Slovenská republika

²V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava, Slovenská republika

³I. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava, Slovenská republika

⁴III. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica akademika Ladislava Dérera, Bratislava, Slovenská republika

⁵Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH), Bratislava, Slovenská republika

⁶Ambulancia všeobecného lekárstva pre dospelých, Poliklinika Ružinov, Bratislava, Slovenská republika

⁷Lekáreň Salvador, Prosalute, Modra, Slovenská republika

⁸Klinika telovýchovného lekárstva LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava, Slovenská republika

⁹Onkologický ústav sv. Alžbety (OÚSA), Bratislava, Slovenská republika

¹⁰Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU), Bratislava, Slovenská republika

¹¹Ambulancia všeobecného a vnútorného lekárstva, Vitacare, s.r.o., Modra, Slovenská republika

¹²Národná transfúzna služba SR, Bratislava, Slovenská republika

¹³Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK a UNB, Nemocnica akademika Ladislava Dérera, Bratislava, Slovenská republika

Súhrn

Končatinovocievna artériová ischemická choroba (periférne artériové ochorenie dolných končatín – PAO DK) je dôležitou manifestáciou systémovej aterosklerózy a iných artériových chorôb cievneho systému. Čím nižší je člen-kovo-ramenový tlakový index, tým väčšie je riziko vzniku závažných akútnych instabilných orgánovaskulárnych príhod (napr. akútneho infarktu myokardu, náhlnej cievnej mozgovej príhody). V práci sa rozoberá komplexná prevencia a liečba končatinovocievnej artériovej choroby. Angiológia/vaskulárna medicína je najrýchlejšie sa rozvíjajúcou špecializáciou internej medicíny.

Kľúčové slová: angiológia/vaskulárna medicína – diabetológia – končatinovocievna artériová choroba – liečba – periférne artériové ochorenie (PAO) – prevencia

Management of diabetic patients with lower extremity peripheral arterial disease

Summary

Extremitovascular arterial ischemic disease (lower extremity peripheral arterial disease – PAD) is an important manifestation of systemic atherosclerosis and other arterial diseases of vascular system. The lower the ankle-brachial pressure index, the greater the risk of serious acute unstable organovascular events (e. g. acute myocardial infarction, stroke). Complex prevention and treatment of extremitovascular arterial disease is discussed in this article. Angiology/vascular medicine is the fastest growing field of internal medicine.

Key words: angiology/vascular medicine – diabetology – extremitovascular artery disease – peripheral arterial disease (PAD) – prevention – treatment

**Text doporučeného postupu v plném znění je dostupný on-line na
www.vnitrnilekarstvi.eu**