

# Léčba hypertenze u chronické renální insuficience

V. Monhart

## Klíčová slova

arteriální hypertenze – renální insuficience – inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu – AT<sub>1</sub>-blokátory – diuretika – blokátory kalciových kanálů

## Souhrn

Cílem léčby arteriální hypertenze u nemocných s chronickou renální insuficiencí je dosažení cílových hodnot krevního tlaku, snížení kardiovaskulární morbidity a mortality a zpomalení progresu renálního postižení. Základem je kombinovaná farmakologická léčba, kterou doplňují dietní a režimová opatření. Všechny třídy antihypertenziv jsou u chronické renální insuficience účinné. Jejich výběr a dávkování závisí na závažnosti renální nedostatečnosti a způsobu eliminace. Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu, AT<sub>1</sub>-blokátory a nedihydropyridinové blokátory kalciových kanálů, které kromě antihypertenzního mají také antiproteinurický efekt, patří mezi léky první volby u hypertenzních nemocných s renální insuficiencí. Základním předpokladem bezpečné léčby je včasné zahájení monitorace funkce ledvin a hladiny sérového draslíku.

## Keywords

arterial hypertension – renal insufficiency – angiotensin-converting enzyme inhibitors – angiotensin II-receptor blockers – calcium channel blockers

## Summary

**Treatment of hypertension in chronic renal insufficiency.** The aim of treatment of patients with arterial hypertension and chronic renal insufficiency is to achieve of target blood pressure values, reduction of cardiovascular morbidity/mortality and delaying of renal impairment progression. The essential therapy is combination of two or more antihypertensive drugs, which is completed by non-pharmacologic measures. All classes of antihypertensive drugs are effective. Their choice and dosage depends on severity of renal insufficiency and route their elimination. Angiotensin-converting enzyme inhibitors, angiotensin II-receptor blockers and non-dihydropyridine calcium channel blockers, which in addition to antihypertensive have also antiproteinuric effect, are first choice of drugs in hypertensive patients with chronic renal insufficiency. The timely beginning of regular monitoring of renal function and potassium serum level is essential precondition of safe therapy.

čilosti onemocnění ledvin. U všech nemocných s renální insuficiencí má být krevní tlak snížen na hodnoty 130/80 mm Hg, při současné proteinurii přesahující 1 g/24 hodin až na 125/75 mm Hg [4,5]. Požadavek na dosažení cílových hodnot krevního tlaku je důraznější u diabetických renálních onemocnění.

2. Zábava vzniku či ovlivnění již přítomných poškození cílových orgánů a léčba klasických a renálně specifických rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění.
3. Zpomalení progresu chronických onemocnění ledvin k zábraně nebo oddálení vzniku terminálního selhání vyžadujícího náhradu funkce ledvin dialyzační nebo transplantací léčbou.

## Léčebné postupy u renální hypertenze

Léčebné postupy u renální hypertenze zahrnují:

- A. Nefarmakologická opatření
- B. Farmakologickou léčbu

## Zvláštnosti léčby renální hypertenze

Ve srovnání s léčbou esenciální a sekundární nerenální hypertenze:

- a) Individualizace podle druhu a pokročilosti renálního onemocnění, stavu funkce ledvin a sodíkové homeostázy.
- b) Základem léčby je farmakoterapie, kterou doplňují nefarmakologická opatření. Vzhledem k převažujícímu střednímu a těžšímu stupni hypertenze je většinou zapotřebí kombinace více léků. Při závažnější renální nedostatečnosti s hladinou sérového kreatininu 400–500 mmol/l je nutné současné podání 3 až 5 antihypertenziv.
- c) Výběr a dávkování antihypertenziv v závislosti na způsobu eliminace léčiva z organismu a na úrovni funkce ledvin (tab. 1).

## Úvod

Arteriální hypertenze je přítomna u 60–80 % nemocných s chronickým postižením ledvin ve stadiu renální insuficience. Podle etiologie převažuje sekundární renální parenchymatózní hypertenze nad renovaskulární hypertenzí a esenciální hypertenzí s druhotným renálním postižením.

Přítomnost arteriální hypertenze u chronické renální insuficience významně zvyšuje kar-

diovaskulární morbiditu a mortalitu [1,2] a ohrožuje nemocné urychlením progresu ledvinové nedostatečnosti směrem k renálnímu selhání a potřebě náhrady funkce ledvin dialýzou nebo transplantací [3].

## Základní cíle léčby hypertenze u chronické renální insuficience

1. Normalizace systémového krevního tlaku k cílovým hodnotám podle druhu a pokro-

**Tab. 1. Dávkování antihypertenziv u chronické renální insuficience [upraveno podle 35].**

úprava dávkování nutná	normální dávkování
ACEI betablokátory (mimo metoprolol, pindolol a timolol)	AT <sub>1</sub> - blokátory blokátory kalciových kanálů alfa <sub>1</sub> -blokátory vazodilatační látky

## Nefarmakologická opatření

Jejich cílem je nejen snížení krevního tlaku, ale také kontrola rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění a doprovodných onemocnění. Opatření zahrnují doporučení platná při léčbě esenciální hypertenze (tab. 2) [6].

### Zanechání kouření

Nikotin obsažený v tabáku vede ke krátkodobému zvýšení aktivity sympatického nervového systému (SNS). Vyplavení cirkulujících katecholaminů následně zvyšuje hodnotu krevního tlaku a tepové frekvence. Okamžitý pressorický efekt kouření je průkazný kontinuálním ambulantním monitorováním krevního tlaku [7].

### Snížení tělesné hmotnosti

Vede k poklesu krevního tlaku a má příznivé účinky i na jiné přidružené stavy – inzulinovou rezistenci, diabetes mellitus, hyperlipidemii a hypertrofii levé srdeční komory. Pokles tělesné hmotnosti o 10 kg může vést ke snížení systolického krevního tlaku o 5–20 mm Hg [8].

### Dostatečná fyzická aktivita

Zvyšuje parasympatický tonus a snižuje sympatickou aktivitu [9]. Příznivé ovlivnění aktivity vegetativního nervového systému vede ke snížení hladiny cirkulujících katecholaminů, poklesu systémové arteriální rezistence, zlepšení inzulinové senzitivity a k úpravě lipidového spektra. U středně závažné a velmi pokročilé renální insuficience je však rozsah možné fyzické aktivity limitovaný přítomností komplikací provázejících ledvinovou nedostatečnost (anémie, kostní a kloubní poruchy).

### Snížení nadměrné konzumace alkoholu

Při požívání alkoholu se uplatňuje efekt dávky: malé množství alkoholu působí do jisté míry protektivně na srdečně-cévní systém, ale s vyšší dávkou požívaného alkoholu stoupá úmrtnost z kardiovaskulárních příčin [10]. Toleruje se konzumace maximálního denního množství 20–30 g alkoholu u mužů a polovinu tohoto množství u žen.

### Omezení příjmu soli

Příjem kuchyňské soli má být nižší než 6 g denně (= 100 mmol sodíku). Snížení obvyklého příjmu soli z 12–16 g na polovinu má za následek průměrný pokles krevního tlaku o 4–6 mm Hg u významného počtu tzv. „sodík-senzitivních“ hypertoničků [11]. Dietní opatření musí respektovat skutečnost, že u chronických onemocnění ledvin je omezena schopnost jak vylučování, tak i zadržování sodíku v organizmu. U osob s chronickou renální insuficiencí a polyurií se doporučený příjem soli řídí obsahem sodíku vyloučeným do moči za 24 hodin (1g NaCl = 17 mmol sodíku).

**Tab. 2. Nefarmakologická léčebná opatření u hypertenze.**

zanechání kouření
snížení tělesné hmotnosti u osob s nadváhou a obezitou
dostatečná fyzická aktivita
snížení nadměrné konzumace alkoholu
omezení příjmu soli
zvýšení konzumace ovoce a zeleniny a snížení celkového příjmu tuků, zejména nenasycených

**Tab. 3. Zásady farmakoterapie renální hypertenze.**

1. zahájení léčby ACEI či AT<sub>1</sub>-blokátorem nebo jejich kombinací
2. při nedostatečném účinku přidat diuretikum nebo blokátor kalciových kanálů
3. není-li dosaženo kontroly hypertenze kombinace s centrálně působícím antihypertenzivem, betablokátořem nebo alfa-1-blokátorem

**Tab. 4. Počáteční dávkování ACEI při snížené funkci ledvin.**

ACEI	úvodní dávka podle hodnoty glomerulární filtrace		
	pod 0,15 ml/s	0,16–0,50 ml/s	0,51–1,00 ml/s
benazepril	1 × 2,5 mg	1 × 5 mg	1 × 10 mg
enalapril	2,5 mg ob den	1 × 2,5 mg	2 × 2,5 mg
fosinopril	1 × 5 mg	1 × 10 mg	1 × 20 mg
lisinopril	1 × 2,5 mg	1 × 5 mg	1 × 10 mg
perindopril	2 mg ob den	2 mg ob den	1 × 2 mg
quinapril	2,5 mg ob den	1 × 2,5 mg	1 × 5 mg
ramipril	1,25 mg ob den	1 × 1,25	1 × 2,5 mg
trandolapril	1 × 0,5 mg	1 × 1 mg	1 × 2 mg

### Ostatní dietní opatření

Substituce draslíku na úkor sodíku může snižovat krevní tlak, ale mechanismus, kterým se tak děje, není zatím zcela jasný (možný vliv draslíku na potlačení proliferace hladkých svalových buněk v cévní stěně). V případě nutnosti zvýšeného dietního příjmu draslíku v polyurickém stadiu chronické renální insuficience, nebo naopak jeho omezení při poklesu diurézy je žádoucí sledovat kromě 24hodinového množství draslíku vyloučeného do moči také jeho sérovou hladinu a stav acidobazické rovnováhy. Podle studie DASH vyšší spotřeba ovoce, zeleniny a ryb spolu s nižší konzumací potravin obsahujících nasycené tuky a cholesterol může významně přispět k poklesu krevního tlaku [12].

### Farmakologická léčba

Přítomnost ledvinové nedostatečnosti vyžaduje kombinovanou antihypertenzní léčbu. Dosažení cílového TK je v klinické praxi dosti obtížné, a to i při použití kombinace většího počtu léků [13]. Hlavní zásady farmakoterapie renální hypertenze uvádí tab. 3.

Požadavky na ideální antihypertenzivum – dlouhodobý účinek, ovlivnění systémové i glomerulární hypertenze, antiproteinurický účinek, extrarenální eliminace, metabolická neutralita a dobrá snášenlivost – nesplňuje žádná ze základních tříd léků pro léčbu hypertenze.

### Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI)

ACEI jsou léky první volby u hypertenzních onemocnění ledvin se současnou proteinurií anebo s renální insuficiencí. V porovnání s jinými antihypertenzivy mají větší antiproteinurický účinek, a to při srovnatelné kontrole krevního tlaku [14]. Renální účinek ACEI se uskutečňuje ovlivněním hemodynamických (snížením glomerulárního tlaku preferenční dilatací eferentní arterioly, poklesem hyperfiltrace) a nehemodynamických mechanismů (omezením trofického působení angiotenzinu II na glomeruly, tubuly a ledvinové intersticiem).

Před zahájením léčby ACEI je třeba posoudit jak závažnost poruchy funkce ledvin, tak i stav vodní a elektrolytové rovnováhy s případnou korekcí dehydratace a úpravou diuretické léčby. Léčba se zahajuje nízkou úvodní dávkou ACEI (tab. 4). V závislosti na velikosti poklesu filtrační funkce ledvin se pokračuje buď sníženou denní dávkou ACEI nebo prodloužením dávkovacího intervalu [15]. K bezpečné udržovací dávce ACEI u hypertenze s renální insuficiencí lze dospět pozvolným zvyšováním při monitoraci renální funkce a sérové hladiny draslíku (S–K<sup>+</sup>). Neexistuje žádná absolutní hodnota sérového kreatininu (S–Kr), která by vylučovala zahájení léčby ACEI při dodržení redukováného dávkování a také včasné a časté laboratorní kontroly.

**Tab. 5. Opatření ke zmírnění poklesu funkce ledvin při léčbě ACEI.**

1. přechodné snížení dávky nebo přerušeni podávání diuretik
2. nízké dávkování ACEI s upřednostněním léčiv s duálním mechanismem vylučování (fosinopril, spirapril a trandolapril)
3. přerušeni léčby nesteroidními antirevmatiky
4. vyšetření S–Kr za 3–5 dnů po zahájení léčby ACEI
5. pozvolné zvyšování dávky ACEI (při nedosažení cílového krevního tlaku a normálním nebo jen lehce zvýšeném S–Kr)
6. opětovné zahájení léčby diuretiky při toleranci léčby

**Tab. 6. Preventivní opatření proti hyperkalemii při léčbě ACEI.**

1. vynechání léků narušujících renální vylučování  $K^+$  – nesteroidní antirevmatika
2. dieta s nízkým obsahem  $K^+$
3. vyloučení  $K^+$  suplement či náhrad soli s obsahem  $K^+$
4. diuretika thiazidová nebo kličková (nutná při S–Kr > 200  $\mu\text{mol/l}$ )
5. úprava metabolické acidózy  $\text{NaHCO}_3$ , je-li koncentrace  $\text{HCO}_3^- < 20 \text{ mmol/l}$
6. snížení dávky ACEI nebo převedení na léčivo s duálním mechanismem vylučování (fosinopril, spirapril a trandolapril)
7. intermitentní podávání iontoměničových pryskyřic

K zesílení jak antihypertenzního, tak i antiproteinurického účinku ACEI dochází snížením přívodu soli nebo kombinací s diuretiky (mimo kalium šetřící) a nedi-hydropyridinovými blokátory kalciových kanálů. Nesteroidní antirevmatika a antacida účinek ACEI snižují. Naopak ACEI omezují účinnost erythropoetinu při léčbě renální anémie u pokročilé renální insuficience.

#### Nežádoucí renální účinky ACEI

##### a) Zhoršení funkce ledvin

Počáteční přechodné snížení ledvinové funkce provázející antihypertenzivní léčbu je výsledkem snížení krevního tlaku a nezávisí na druhu antihypertenziva. U ACEI je tato komplikace častější, protože snížení glomerulárního tlaku vyvolané poklesem systémového krevního tlaku je zřetelně současnou dilatací eferentních arteriol glomerulů. Ke snížení filtrační funkce ledvin v souvislosti s léčbou ACEI dochází především u nemocných s renální insuficiencí nebo se srdečním selháním.

*Malé neprogredující zvýšení S–Kr při léčbě ACEI není důsledkem strukturálního poškození ledvin, ale projevem příznivého ovlivnění renální hemodynamiky – úpravy zvýšeného intraglomerulárního tlaku [16]. Nejčastěji se projeví během 1. týdne léčby, dosahuje vrcholu ve 2. týdnu a doznívá ve 3–4. týdnu, kdy dochází ke stabilizaci [17]. Nepřesahuje-li vzestup S–Kr 20–30 % výchozí hodnoty a nezvyšuje se při dalším sledování, není překážkou další léčby pomocí ACEI [18]. U většiny léčených se funkce ledvin v období následujících 2 měsíců zlepší nebo upraví [16].*

*Zvýšení S–Kr > 30 % výchozí hodnoty narušující při dalším sledování vyžaduje přerušeni léčby ACE-inhibitory a pátrání po možných příčinách renální dysfunkce [18,19]:*

- 1) hemodynamicky významné stenóze obou renálních tepen (nebo tepny solitární funkční ledviny)
- 2) sníženém intravaskulárním objemu při omezeném příjmu tekutin, gastroenteritidě či diuretické léčbě [20,21]
- 3) poklesu efektivního intravaskulárního objemu u závažnějšího srdečního selhání [20,22]
- 4) zvýšené renální vazokonstrikci při současné léčbě nesteroidními antirevmatiky či cyklosporinem [18].

*Akutní selhání ledvin u osob léčených ACEI – predispozicí je diuretiky vyvolaná deplece sodíku a přítomnost chronické renální insuficience [20,23]. Převážně jde o asymptomatické, neoligurické (s normální diurézou či polyurií), hyperkalemii provázené selháním ledvin, které je téměř vždy reverzibilní [23]. Může být ovlivnitelné ambulantně přerušeni léčby pomocí ACE-inhibitory, diuretiky nebo obojího [24]. Potřeba hemodialyzační léčby je jen u malé části nemocných [20].*

*Preventivní opatření při včasném a důsledném provedení pomáhají omezit míru poklesu ledvinové funkce (tab. 5).*

##### b) Hyperkalemie

Blokáda vzniku angiotenzinu II vyvolaná ACEI snižuje tvorbu aldosteronu, který je hlavním hormonálním stimulem močové exkrece draslíku. K nárůstu sérové hladiny draslíku (S–K<sup>+</sup>) nad 5,1 mmol/l dochází přibližně u 10 % léčených ACEI [25]. U jedinců s normální funkcí ledvin zvýšení S–K<sup>+</sup> nepřesahuje 0,5 mmol/l. K závažnější hyperkalemii může dojít u nemocných s renální insuficiencí, při současné léčbě kalium šetřícími diuretiky, kaliovými suplementy a nesteroidními antirevmatiky.

U jedinců s chronickým onemocněním ledvin je nutné vyšetřit S–K<sup>+</sup> na konci 1. týdne po zahájení léčby ACEI. Podání kalium šetřícího diuretika spironolaktonu v dávce 25 mg (jedinečně 50 mg) denně u nemocných se srdečním selháním léčených ACEI je možné jen v kombinaci s kličkovými diuretiky.

*Preventivní opatření ke snížení kalemie jsou nutná již při zvýšení hladiny S–K<sup>+</sup> nepřesahujícím 5,6 mmol/l [18]. Při jejich dodržení (tab. 6) je výskyt závažnější hyperkalemie vedoucí k přerušeni dalšího podávání ACEI nízký, a to i u nemocných se střední nebo závažnou chronickou renální insuficiencí. Přesáhne-li S–K<sup>+</sup> hodnotu 5,6 mmol/l je nutné nahrazení ACEI jinými antihypertenzivy.*

#### Antagonisté angiotenzinu II (AT<sub>1</sub>-blokátory)

AT<sub>1</sub>-blokátory ve srovnání s ACEI účinněji ovlivňují systém renin-angiotenzin. Blokáda AT<sub>1</sub>-receptorů brání vzniku většiny nepříznivých účinků angiotenzinu II – vazokonstrikci, zvýšené sekreci aldosteronu, tkáňové proliferaci, účasti při vzniku remodelace a hypertrofie myokardu. Na rozdíl od působení ACEI se nezvyšuje hladina bradykininu. Vazba angiotenzinu II na volné AT<sub>2</sub>-receptory působí vazodilataci a brzdí buněčný růst. Do 1. generace AT<sub>1</sub>-blokátorů patří losartan a valsartan. Ve 2. generaci jsou kandesartan, irbesartan, eprosartan a telmisartan. AT<sub>1</sub>-blokátory mají s ACEI srovnatelný účinek při snížení krevního tlaku i proteinurie [26]. Losartan má oproti ostatním AT<sub>1</sub>-blokátorům navíc urikosurický účinek. Výhodou AT<sub>1</sub>-blokátorů v léčbě hypertenze je velmi dobrá snášenlivost – výskyt nežádoucích účinků je na úrovni placeba.

Rozdíl mezi ACEI a AT<sub>1</sub>-blokátory [27] vychází z odlišných farmakokinetických a farmakodynamických vlastností:

- 1) Výraznější pokles glomerulární funkce při léčbě ACEI souvisí se zvýšenými hladinami bradykininu.
- 2) ACEI s výjimkou fosinoprilu, trandolaprilu a spiraprilu se vylučují převážně ledvinami (tab. 7), naopak AT<sub>1</sub>-blokátory hlavně játry nebo játry a ledvinami (tab. 8).

*Výskyt mírného zvýšení sérového kreatininu u lehké chronické renální insuficience je při léčbě AT<sub>1</sub>-blokátory srovnatelný s ACEI [28]. Nevýžadují redukcí dávkování u osob s mírnou nebo středně závažnou renální insuficiencí. Opatrnost se doporučuje při hodnotě clearance kreatininu 0,25 ml/s.*

#### Diuretika

Mechanismy, kterými diuretika snižují krevní tlak, nejsou ani po 40 letech jejich používání dostatečně objasněny:

- 1) natriuretický účinek s redukcí plazmatického objemu a srdečního výdeje [29,30]

- 2) vazodilatační účinek – snížení Na<sup>+</sup> ve stěně cévní brány vstupu Ca<sup>++</sup> do buněk  
3) uvolňování prostaglandinu PGE.

Thiazidová diuretika ztrácejí svoji účinnost při hladině S–Kr 220 μmol/l (= clearance kreatininu 0,67 ml/s) a jsou nahrazována kličkovými diuretiky. Furosemid je účinný při zvyšujícím se dávkování i při velmi pokročilé renální insuficienci, je však třeba počítat s určitým rizikem nefrotoxicity. Současné podání thiazidového a kličkového diuretika má synergické působení, protože vede k sekvenční blokádě zpětné resorpce sodíku v průběhu celého nefronu. Umožní zvýšené vylučování sodíku, ale i draslíku při snížení dávky zvláště kličkového diuretika – je nutné sledování hladiny S–K<sup>+</sup>. Kalium šetřící diuretika nepodáváme pro riziko vzniku hyperkalemie u závažnější renální insuficience, zvláště při diabetické nefropatii, při současné léčbě nesteroidními antirevmatiky nebo neselektivními betablokátory. U hypertoniiků s renální insuficiencí léčených ACEI lze při léčbě chronického srdečního selhání podávat malou dávku spironolaktonu (25 mg denně) spolu s kličkovým diuretikem, ale při sledování hladiny S–K<sup>+</sup>.

### Blokátory kalciových kanálů (BKK)

K léčbě hypertenze se používají BKK s účinkem na vysokovoltážové kanály L-typu, které řídí průnik Ca<sup>2+</sup> přes buněčnou membránu z extracelulárního prostoru do buňky a ovlivňují obsah Ca<sup>2+</sup> v cytoplazmě srdečních a cévních buněk. Dihydropyridinové (DHP) BKK působící více selektivně na cévy vedou k poklesu krevního tlaku snížením periferní cévní rezistence. Nedihydropyridinové (NDHP) BKK kromě vazodilatačního účinku snižují stažlivost a zpomalují šíření vzruchu v myokardu. Při léčbě hypertenze se upřednostňují BKK s prodlouženým účinkem. Neovlivňují plazmatickou reninovou aktivitu, ale volum-dependentní hypertenze s nízkou hladinou reninu lépe reaguje na léčbu BKK.

Renální účinky BKK jsou rozdílné:

- 1) DHP-BKK dilatují aferentní arterioli, zvyšují intraglomerulární tlak a snižují autoregulační schopnost ledvin [31]. Nepříznivý vliv na renální hemodynamiku se neuplatňuje při kombinaci s ACEI [32].
- 2) NDHP-BKK ovlivňují renální autoregulaci méně, mohou působit vazodilataci i eferentní arterioly, snížit glomerulární tlak a permeabilitu [33]. Antiproteinurický účinek byl prokázán pouze u NDHP-BKK, a to jak u diabetických, tak i u nediabetických onemocnění ledvin [34]. U BKK dosud chybí přesvědčivé důkazy o jejich renoprotekci. Výhodou BKK je, že neovlivňují metabolismus lipidů a sacharidů, sérové hladiny kyseliny močové a K<sup>+</sup>. S výjimkou

Tab. 7. Srovnání ACEI.

ACEI	dávkování (mg)	plazmatický poločas (hodiny)	eliminace
benazepril	10–40	21	ledviny
enalapril	10–40	11	ledviny
fosinopril	10–20	12	ledviny = játra
lisinopril	10–40	13	ledviny
moexipril	7,5–15	2–9	ledviny
perindopril	4–8	9	ledviny
quinapril	10–40	3	ledviny
ramipril	2,5–10	12	ledviny
spirapril	3–6	30	ledviny = játra
trandolapril	1–4	16–24	ledviny < játra

Tab. 8. Srovnání AT<sub>1</sub>-blokátů.

AT <sub>1</sub> - blokátory	dávkování	vylučování
kandesartan	1krát denně 8–16 mg	játra = ledviny
eprosartan	1krát denně 400–800 mg	játra > ledviny
irbesartan	1krát denně 150–300 mg	játra
losartan – aktivní metabolit EXP–3174	1–2krát denně 50 mg	játra = ledviny
telmisartan	1krát denně 40–80 mg	játra
valsartan	1–2krát denně 80 mg	játra > ledviny

verapamilu nevyžadují úpravu dávkování při renální insuficienci.

### Jiná antihypertenziva

Z betablokátů mají přednost léky s vnitřní sympatomimetickou aktivitou, které podobně jako antihypertenziva s centrálními účinky a selektivní alfa1-blokátory nemají nepříznivý vliv na hladinu krevních lipidů.

### Ostatní přídatná farmakoterapie

Je zaměřena jak na ovlivnění současně přítomných metabolických poruch – hyperlipidemie (statiny) a hyperhomocysteinemie (kyselina listová a vitamin B<sub>12</sub>), tak i na snížení agregace trombocytů (kyselina acetylsalicylová).

### Závěr

Dosažení požadované kontroly krevního tlaku u hypertenzních nemocných s chronickou renální insuficiencí je ve srovnání s léčbou hypertoniiků s neporušenou funkcí ledvin nesrovnatelně obtížnější. Vždy vyžaduje kombinaci více antihypertenzních léků, jejichž výběr a dávkování přihlíží k závažnosti poruchy filtrační funkce ledvin a způsobu vylučování z organismu. Současná potřeba zpomalit progresi renálního postižení upřednostňuje používání antihypertenziv s prokázaným antiproteinurickým účinkem – ACEI, AT<sub>1</sub>-blokátů a nedihydropyridinových blokátů kalciových kanálů. Vysoká kardiovaskulární morbidita a mortalita postihující nemocné s hypertenzí a porušenou funkcí ledvin vyžaduje komplexní léčebný přístup – kromě antihypertenzní také hypolipidemickou a antiagregační medikaci.

### Literatura

1. Levey AS, Beto JA, Coronado BE et al. Controlling the epidemic of cardiovascular disease in chronic renal disease: What do we now? What do we need to learn? Where do we go from here? Am J Kidney Dis 1998; 32: 853–906.
2. Mailloux LU, Levey AS. Hypertension in patients with chronic renal disease. Am J Kidney Dis 1998; 32 (Suppl 3): 120–141.
3. Martinez-Maldonado M. Role of hypertension in the progression of chronic renal disease. Nephrol Dial Transplant 2001; 16(Suppl 1): 63–66.
4. European Society of Hypertension – European Society of Cardiology Guidelines Committee. 2003 European Society of Hypertension-European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension. J Hypertens 2003; 21: 1011–1053. Erratum in: J Hypertens 2003; 21: 2203–2204.
5. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR et al. The seventh report of the joint national committee on prevention, detection, evaluation, and treatment of high blood pressure. The JNC 7. JAMA 2003; 289: 2560–2572.
6. Cifková R, Horký K, Widimský J et al. Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze – verze 2004. Cor Vasa 2005; 47(Suppl K): 3–16.
7. Verdecchia P, Schillaci G, Borgioni C et al. Cigarette smoking, ambulatory blood pressure and cardiac hypertrophy in essential hypertension. J Hypertens 1995; 13: 1209–1215.
8. He J, Whelton PK, Appel LJ et al. Long-term effects of weight loss and dietary sodium reduction on incidence of hypertension. Hypertension 2000; 35: 544–549.
9. Arakawa K. Antihypertensive mechanism of exercise. J Hypertens 1993; 11: 223–229.
10. Fagrell B, De Faire U, Bondy S et al. The effects of light to moderate drinking on cardiovascular diseases. J Intern Med 1999; 4: 331–340.
11. Cutler JA, Follmann D, Allender PS. Randomized trials of sodium reduction: an overview. Am J Clin Nutr 1997; 65(Suppl): 643–651.

12. Sacks FM, Svetkey LP, Vollmer WM et al. Effects on blood pressure of reduced dietary sodium and the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet. *N Engl J Med* 2001; 344: 3–10.
13. Ridao N, Luno J, Garcia de Vinuesa S et al. Prevalence hypertension in renal disease. *Nephrol Dial Transplant* 2001; 16(Suppl 1): 70–73.
14. Garcia de Vinuesa S, Luno J, Gomez-Campdera F et al. Effect of strict blood pressure control on proteinuria in renal patients treated with different antihypertensive drugs. *Nephrol Dial Transplant* 2001; 16(Suppl 1): 78–81.
15. Kaplan NM. *Kaplan's Clinical hypertension*. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2006.
16. Palmer BF. Angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers: what to do if the serum creatinine and/or serum potassium concentration rises. *Nephrol Dial Transplant* 2003; 18: 1973–1975.
17. Ali A. Using of angiotensin-converting enzyme inhibitors in patients with heart failure and renal insufficiency: how concerned should we be by the rise in serum creatinine? *J Am Geriatr Soc* 2002; 50: 1297–1300.
18. Palmer BF. Renal dysfunction complicating the treatment of hypertension. *N Engl J Med* 2002; 347: 1256–1261.
19. Bakris GL, Weir MR. Angiotensin-converting enzyme inhibitor-associated elevations in serum creatinine: is this a cause for concern? *Arch Intern Med* 2000; 160: 685–693.
20. Mandal AK, Market RJ, Saklayen MG et al. Diuretic potentiate angiotensin converting enzyme inhibitor-induced acute renal failure. *Clin Nephrol* 1994; 42: 170–174.
21. Wyncel A, Ebikili B, Melin JP et al. Long-term follow-up of acute renal failure caused by angiotensin converting enzyme inhibitors. *Am J Hypert* 1998; 11: 1080–1086.
22. Ljungman S, Kjekshus J, Swedberg K. Renal function in severe congestive heart failure during treatment with enalapril (The Cooperative North Scandinavian Enalapril Survival Study/CONSENSUS/ trial. *Am J Cardiol* 1992; 70: 479–487.
23. Toto RD. Renal insufficiency due to angiotensin-converting enzyme inhibitors. *Min Electrol Metab* 1994; 20: 193–200.
24. Navis G, Faber HJ, de Zeeuw D, de Jong PE. ACE inhibitors and the kidney. A risk-benefit assesment. *Drug Safety* 1996; 15: 200–211.
25. Reardon LS. Hyperkalemia in outpatients using angiotensin-converting enzyme inhibitors. *Arch Intern Med* 1998; 158: 26–32.
26. Schultz E, Bech NJ, Pedersen EB et al. A randomised, double-blind parallel study on the safety and antihypertensive efficacy of losartan compared to captopril in patients with mild to moderate hypertension and impaired renal function. *Nephrol Dial Transplant* 1999; 14(Suppl 4): 27–28.
27. Klahr S, Morrissey J. Comparative effects of ACE inhibition and angiotensin II receptor blockade in the prevention of renal damage. *Kidney Int* 2002; 62(Suppl): 23–26.
28. Pitt B, Segal R, Martinez FA et al. Randomised trial of losartan versus captopril in patients over 65 years with heart failure (Evaluation of Losartan in the Elderly Study, ELITE). *Lancet* 1997; 349: 747–752.
29. Johnston CI. The place of diuretics in the treatment hypertension in 1993: can we do better? *Clin Exp Hypertens* 1993; 15: 1239–1255.
30. Puschett JB. Diuretics in hypertension. In: Singh BN et al (eds). *Cardiovascular Pharmacology and Therapeutics*. New York: Churchill Livingstone 1994: 885–908.
31. Griffin KA, Picken MM, Bakris GL et al. Class differences in the effects of calcium channel blockers in the rat remnant kidney model. *Kidney Int* 1999; 55: 1849–1860.
32. Herlitz H, Harris K, Risler T et al. The effects of an ACE inhibitor and a calcium antagonist on the progression of renal disease: The Nephros Study. *Nephrol Dial Transplant* 2001; 16: 2158–2165.
33. Hayashi K, Ozawa Y, Fujiwara K et al. Role of actions of calcium antagonists on efferent arterioles – with special references to glomerular hypertension. *Am J Nephrol* 2003; 23: 229–244.
34. Bakris GL, Weir MR, Secic M et al. Differential effects of calcium antagonist subclasses on markers nephropathy progression. *Kidney Int* 2004; 65: 1991–2002.
35. Misra M, Reams GP, Bauer JH. Hypertension in patients on renal replacement therapy. In: Oparil S, Weber MA (eds). *Hypertension: A companion to Brenner and Rector's The Kidney*. Philadelphia: WB Saunders 2000: 531–539.

*Doručeno do redakce 4. 10. 06  
Přijato k otištění po recenzi 19. 10. 06*

**prof. MUDr. Václav Monhart, CSc.**

Interní klinika 1. Lékařské fakulty UK  
a Ústřední vojenské nemocnice, Praha

Vítězem soutěže v mimořádném čísle  
KARDIOLOGICKÉ REVUE (leden 2006)

se stal **MUDr. Jiří Bizoň**.

Výherce obdrží **TONOMETR OMRON M7**

a jako bonus **SÍŤOVÝ ZDROJ**.

Cenu do soutěže věnovala firma **CELIMED**,

která je obchodním zastoupením japonské firmy **OMRON**.

Výherci srdečně blahopřejeme.

